



蔭瓜易於貯藏 適宜家庭自製

成蔭瓜，(醬菜)怎樣做法自製供家庭食用，是否可長期貯藏? (彰化縣埔里油車村瓦風路二五號胡潤泉)

【答】：蔭瓜製造可參考豐年六卷十四期宗仙和作「特製蔭瓜製法」一稿蔭瓜比普通醬菜容易長期貯藏，自製長期食用並無問題。詳細請參照該稿可也。(朱仙和)

芋頭施化學肥料不會影響品質

【問】：一、芋頭生育期間有多久?如果在「立秋」以前收穫插二期水稻，應該在什麼時候種植?
二、據老老說：芋頭如果施用化學肥料，將來塊根會發不爛(不發)是否事實?
三、芋頭應該施用何種肥料施用多少?
四、每一分地能產多少塊根收穫?
五、每一分地種多少株?(嘉義中埔鄉鹽館村下庄仔八號)

【答】：一、芋頭之生育期間因品種不同各有差異普通一九〇天至一八〇天左右。
二、如欲在立秋以前收穫應在二月下旬或三月上旬種植，芋頭可以催芽等芽伸出至五、六公分時定植或育苗至木架二、三枚時定植可。可定植後須灌水以促活成生長。
三、使用化學肥料不會影響其品質但不可偏用氮肥，應多施磷酸及鉀質肥料以利澱粉蓄積提高其含量。
四、芋頭應多施腐熟堆肥或廐肥為佳。每十公畝一千五百公斤人糞尿一千二百公斤過磷酸鈣二五公斤尿素八公斤氯化鉀五公斤，如將氯化鉀改為施用木灰更佳，其數量六十七十公斤。
五、每株平均產量〇、五、一、五、五公斤。十公畝產量為一千二百一十、一千二百公斤目。

前市價格概心零售價新豐幣叁元。
六、每十公畝栽植株數為一千一千五百株(王進生)

鵝鴨每年產蛋三百以上


【問】：一、鵝鴨的壽命有多久?
二、飼養鵝鴨是否有書籍參考何處有售?
三、本省鵝鴨盛行飼養於那些地方?
四、鵝鴨是否每日能下蛋。
五、鵝鴨有沒有害亂流行的可能，鵝鴨是否可飼養。(廣東縣大甲鎮頂店里彌上路三三號許富鈔)

【答】：一、二年。
二、全省各警局均有出售。
三、新竹市。
四、一年能產三百粒以上。
五、不會患霍亂，勿飼養較好。(邱見堂)


文旦及白柚前途可觀

【問】：一、住里栽植椪柑及桶柑成績不大理想是何原因?
二、若栽培椪柑是否適合?
三、椪柑是否適合，請介紹比較易於栽培，適合本區而產量好者。
四、文旦及白柚，前途及產量之比較各點，敬請賜示(佳里鎮中山路二四七號黃金傳)

【答】：一、所開椪、桶柑栽培成績不大理想，因所提資料不詳，難難確定。
二、椪柑樹勢較強健，若排水良好好適宜貴地栽培十年者每株可產十二公斤。
三、椪柑中印子柑，盧金剛兩種樹勢強健，收量高，適宜於貴地栽培。
四、文旦、白柚為本省之特產，前途可觀，五、十年生十一、十五年生十六、二十年生麻豆文旦最多可產二〇粒豆白柚最多可產一〇〇粒。(翁仁祿)



▲農家的大福音：在春夏秋冬四季均可下種各種品種：由二代七十餘年之經驗蔬菜種子專家，最新改良特選優良品種信用最可靠供應國內外農友可安心栽培請勿失良機敬請賜顧歡迎選購。
◎二號早中生甜天黑葉結球白菜：每粒重量三斤以上。下種期：7月上旬、9月下。
◎紐約大長葫瓜
◎清皮大長葫瓜
◎竹山葫瓜
◎清河改良長形菜瓜
◎箭瓜(毛瓜)
◎木瓜(毛瓜)(金瓜)
◎粗米大苦瓜
◎粉白大包(冬瓜)
◎牛腿(冬瓜)
◎赤菜(冬瓜)
◎赤菜大包(冬瓜)
◎清河改良黑仁七寸豇豆
◎清河改良黑仁皇帝豆
◎新嘉坡肉豆
◎早中生70天長葉純硬白結扁花椰菜
◎中生晚白結扁花椰菜
◎瑞興燕窩
◎日本黑葉美濃早生菜頭(蘿蔔)
◎美國紅心五寸人蔘
◎日本長岡交配一號甘藍
◎海谷三池中生甘藍
◎サクセツン 蕪菜系甘藍
◎鳥山圓型豆仔薯
◎長岡交配福壽二號トマト
◎新一代トマト
◎媽媽里トマト
◎媽媽露西トマト
◎新嘉坡西トマト
◎美國球型洋蔥
◎日本坂田一代交配甘藍
◎日本坂田一代交配甘藍
◎日本坂田一代交配甘藍



- ◎晚生黑葉結球白菜
- ◎黑仁四寸豇豆
- ◎黑仁四季豇豆
- ◎伊國青花菜
- ◎金門早生結球菜(蘿蔔)
- ◎北京早生結球菜
- ◎早生40天長葉馬耳他菜頭
- ◎大白挖切天菜頭(蘿蔔)
- ◎頭早50天長身菜頭(蘿蔔)
- ◎止：整年9月
- ◎止：株距9尺
- ◎交配種長身菜頭(蘿蔔)
- ◎60天長身冬瓜白菜頭
- ◎鳳山改良短種菜頭
- ◎阿里山黑葉美濃菜頭
- ◎正天字梅花春種菜頭
- ◎清河改良大梅花春種菜頭
- ◎清河改良果穗トマト
- ◎新嘉坡香瓜(梨仔瓜)
- ◎美國球型洋蔥
- 其他各色品種應有盡有敬請選購，並各種農藥，肥料噴霧器等請參閱一九六四年新編農法，其內容詳細刊登在案，並請全省農友光臨指教。
◎敬告農友：敝行自一九六四年新編農法已出版供農友附郵三元即寄各地巡迴拜訪歡迎提供高見賜教是禱。
註：過去有很多強徒奸商利用敝行之名義到各地假冒敝行出賣不良種子，這幾年來受騙者頗多，而且敝行二代七十餘年來一向單獨經營，從未與他人共同營業之現象，盼望全省各位愛好之顧客提高警覺，如採購各色種子時請直接向敝行選購以免魚目混珠受損之害。

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八八四號
劃撥儲金嘉字八〇〇三七

東部海拔千公尺可種蠶豆油菜

【問】東部海拔一千公尺之處，是否適合栽種蠶豆(馬齒豆)及油菜籽兩種。

二、該兩品種是寒帶作物或熱帶作物。收穫期多長，是否要噴藥用何種藥。

三、該田豆與油菜籽種植時行株距離如何。(臺東縣關山鎮公所郭樹)

【答】：一、東部海拔一千公尺處可以栽培油菜及蠶豆(馬齒豆)，惟生育日數會比平地為長。

二、這兩個作物不喜歡太濕，因此必需利用冬季栽培，收穫期間油菜約需一四〇天(包括育苗期間)蠶豆約需一八〇天，生育中會發生蟲害的，因此必須噴藥，即油菜主要蟲害有蚜蟲及小葉蛾，蚜蟲以五〇%馬拉松乳劑一千至一千五百倍液，小葉蛾以六、五〇% BHC 可濕性粉劑四百倍液可以防治，蠶豆主要蟲害有蚜蟲，潛蠅蟲及黑夜盜蟲等，蚜蟲防治法與油菜相同，潛蠅蟲以安特靈一千倍液，黑夜盜蟲以地特靈乳劑一千倍液可以防治。

三、油菜播種為九月中旬至十月上旬，行距五十公分(臺中特三號四十分分)，株距二十至三十公分(臺中特三號十公分)蠶豆播種時期為九月下旬與十月上旬，行距五十公分，株距三十五至四十分分(林黨生)



水稻氮肥應分三次施用

【問】：一、水稻施肥量如何計算？或是以所合成成分計算？(嘉義縣竹崎鄉龍山村水尾仔二號許文明)

二、水稻施肥量是以三要素重量計算，或是以所合成成分計算？(嘉義縣竹崎鄉龍山村水尾仔二號許文明)

【問】：一、通常每分地施用硫酸四〇公斤過磷酸鈣二〇公斤氯化鉀十公斤。(氮八公斤)(磷三·六公斤)(鉀五公斤)但氮質肥料應分二至三次施用為宜，肥料用量應以三要素成分計算較妥，如氮素八公斤換算作肥料量是硫酸四〇公斤，或者尿素約十八公斤。(吳洛東)

嘉義後作宜種菜豆番茄

【問】：一、水稻後作之甘藷和甘蔗(九月上旬種)之間，想種一短期蔬菜作物以何種為有利而且容易成功。

二、如種新香瓜是否適合，八月中下旬收穫最遲應以何時播種？(嘉義縣鹿草鄉施定村四八號林政勇)

【答】：一、以實地之氣候條件而定種植矮性菜豆，加工用番茄(羅瑪茄)為宜。

二、新香瓜如欲八月中下旬收穫應在六月下旬播種。查實地之播種適期為二月上旬至五月下旬，十月下旬，故最遲應在十月上旬播種，以免一月中寒流侵襲本省時受害。(王進生)

【問】：一、雜交種鳳梨苗，臺農七號及二號何處有售？每株價若干？

臺農二號鳳梨 不耐貯藏

二、二號及七號那種肉質果比較多？(雲林縣古坑鄉溪鄉村吳脚一之一號陳文財)



【答】：一、雜交種鳳梨臺農七號及臺農二號，目前僅試驗機關栽植少數作為品種保存外，農家栽植者極少。二、臺農二號較臺農七號肉質果多，但兩種部不耐貯藏。(黃季春)

南部可以種植大白杜蘿蔔

【問】：一、南部的氣溫是不是可以播種大白杜蘿蔔？

二、二分地種子多少？

三、畦面寬多寬，畦溝寬，每畦種幾行，距離多寬？(臺南鎮光和村五號劉榮文)

【答】：一、南部的氣候可以播種大白杜，播到十月。

二、二分地約需一·二公斤，二·〇公斤種子。

三、田間行距四〇公分株間十八公分為標準。(陳培島)

農友們蔬菜外銷年年增加

種植外銷蔬菜 請選購

丸種榮譽出品。字治交配脫普甘藍。字治交配USM一號甘藍。坂田榮譽出品。坂田交配三季時中學生甘藍。坂田交配黑葉理想甘藍。坂田榮譽出品。坂田交配濱光結球白菜。八江榮譽出品。新黑田紅心五寸人參。黑田紅心五寸人參。

(胡蘿蔔外銷琉球、日本，數量頗巨，此品種最適宜該地需要品種、色澤，口味均比較已在臺灣種植的美國、日本種為優)其他長岡一號甘藍、長岡陽春甘藍、長岡秋時中學生甘藍、抱子甘藍、紫色瑞典蕪菁、各種交配蕃茄、包心萵苣、日本花不知時無大根、日本黑葉系美濃早生大根、北京劍葉結頭菜、繪袋裝草花種子、及日本美國秋時種籽全部入貨。

◎各種日本果樹苗歡迎預約採購

秋季蔬菜 種子價格表 函索即寄

輸入 臺灣農產企業公司 經銷 臺灣農業資材公司 臺北市迪化街一段八十六號 電話：四四二五三·四三六五 劃檢儲金：一·二七九


最新改良新品六月桶柑苗

◎六月桶柑有六大特點◎

- (1) 六月桶柑採果期五月至六月間。
 - (2) 六月桶柑三年可生產。
 - (3) 六月桶柑果粒大沒有子實。
 - (4) 六月桶柑果汁豐富氣味芬芳。
 - (5) 六月桶柑果皮容易剝皮適合製罐。
 - (6) 六月桶柑採收是臺灣特產可以輸出國爭取外匯。
- 有保證書可以負責保證
本農場參觀者請早訂購
◎六月桶柑苗有特別優良與美麗每株二尺半以上只售十元

興農記農場

連絡處：臺北市中山北路二段183巷4號之12 電話：50209



洋菇塊菌病可用福馬林消毒

【問】：去年因氣候影響洋菇病害發生，使我們菇農吃虧甚大。現在大家議論紛紛，是以請教左列幾項疑問。

一、(日本)トラウル病菌……這個病名是否有確實、病狀是什麼現象？有何防治法？

二、洋菇地微病，由土壤傳染而來，但現在堆肥已全部遷出舊菇舍，並徹底以七五% DDT 混合福爾馬林消毒與硫磺燻，未知如此消毒後該舊洋菇舍仍可使用否？

三、如患有第一項之(日本名)トラウル病者，照第二項之消毒法未知能否完全消毒？繼續使用該菇舍？

四、去年普遍發生由菌絲生子實體就枯死(如吹南風一樣的死法)這個問題是否氣候過濕而影響或發生病害所影響？(員林鎮三條里員林路四十號劉英魁)

【答】：一、トラウル病菌即洋菇塊菌病，發生該病時洋菇菌絲生長衰弱，幼菇萎死，覆土表面逐漸由該病菌長出白色褐紅色菌狀菌塊，如大勢發生時，已無挽救辦法，唯初期發生時將感架之堆肥或覆土搬出燒却，並噴福馬林(五%)消毒再補充新堆肥及覆土。

二、所言「地微病」今應改為「洋菇塊菌病名稱爲宜，貴舍所用之消毒法可以施用

，經徹底消毒之舊菇舍可以繼續使用。

三、如照第二項徹底實施消毒，可防除洋菇塊菌病，經消毒之菇舍仍然可以使用。

四、該問題不是單純因氣候因子所引起，其中尚有其它因素造成，農試所正在研究中。(胡開仁)

大豆糊仔栽培宜放乾田水

【問】：一、現已下種秋作「落花生」，中間想種「臺大高雄五號大豆」，收穫後再種春期落花生，這樣是否產量會差，如產量會差，有方法可補救嗎？

二、「臺大高雄五號大豆」是否，可於稻谷收穫前散播水花在水田裏否，產量怎樣？(雲林縣崙背鄉水尾村洲仔路三號王文龍)

【答】：一、這種輪作方式是可以的，但是全部是豆科作物似嫌不大理想。

二、「臺大高雄五號」可以做糊仔栽培，惟需注意下列各點：

- 1 田裏的水要排乾，以免豆種浸水腐爛。
- 2 播種期以十月上旬爲宜，過遲因氣溫低，將影響產量。
- 3 水稻收穫前七至十天播種爲宜，過早則影響大豆，生育不良。(劉文慶)

綠肥兼 紫雲英 高脚 種子

▲種子生產原始地信用可靠

▲新鮮純潔保證高脚現貨供應

▲樣品說明書備索請慎重比較

◎請注意：外產矮脚種紫雲英子進口上市了敬請慎重選購。

許源發種子行

臺北縣樹林鎮鎮前街二十七號之三

電話：樹林 一七一號

郵政劃撥儲金五四〇九號

時代靠外銷 外銷好種

- ▲蘆筍子美國原裝美麗華盛頓十月上旬到貨
- ▲蘆筍苗歐洲最新優良品種潔白肥大
- ▲筍尖形維他命甘藍美味最適合生食
- ▲坂田中早生甘藍堅實耐運適合外銷
- ▲濱光結球白菜美甜結實適合國內外
- ▲瑞典蕪菁原裝種類純正唯一豐產種
- ▲日本美國香港各國進口種子歡迎照會

合成種子行

臺北市迪化街一段二一五號
電話：四三三二二三號
郵政劃撥一四三三五號

農友們：增加你的收入

請選購興農的優良種子
紫皮黃肉瑞典蕪菁(美國 Burpee 公司所產半磅原封罐裝) ◎興農飼料蘿蔔 ◎興農大梅花
秋季播種之各種子已入貨了
詳細請閱一九六四年秋季興農園藝新知識函索
付郵二元即寄

輸入元
林興農行股份有限公司
興農種子行
本行 臺北縣三重市重新路三段一〇八號
電話：九七一六三
劃撥儲金四〇二八號
連絡處 豐原鎮中山路二八二之一號

確保豐收請用 (葉面撒布劑)



檢核局許可查核字第四〇〇五五號
(成分正確效果確實)
最新速效綜合植物營養素
混合液體肥料

速果健全品質增加
迅速發育改善收成
根止發病預防充實
發旺病實充實
提早發芽成實
提早發芽成實

函索即寄
說明書

(全省鄉鎮農會農藥行均有售)

技術 臺灣植物營養科學研究所

製造 臺灣植物營養股份有限公司
彰化縣北斗鎮元市街五四號 電話40號