

農業信

葡萄黑痘病可洒六一六波爾多液

【問】：一、現在小弟再寄一些葡萄標本，請先生查收、賜教。這種病非常嚴重，病症重者，多漸漸枯乾。請先生賜教指示以利防治。（嘉義番路大湖村火燒寮邱明開）

【答】：一、寄來之葡萄病害標本，是黑痘病，現在病害既已發生，撒藥實無法將其完全治癒，而僅能防止病害繼續蔓延，防治如下：

(1)迅速除去病枝葉，集中燒燬。(2)每隔一星期撒佈「六一六」石灰波爾多液一次，連續數次。(3)發芽前之種變，撒佈或塗布石灰硫黃合劑（波爾美5度液）發芽後新梢萌出十公分時開始至開花前，每隔一星期撒佈「三一·一五式」石灰波爾多液，大體言之可預防此病之發生。（吳福壽）



本省平地山地都可種植

【問】：一、本省有無「日本種甘柿苗」價格如何？

二、栽種後幾年會生果何等地方適宜？

三、本省在來種柿有幾多種，何種最理想？

四、栽種柿株間距離多少為適宜？

五、施肥何種肥料是適合？（臺中縣東勢鎮粵寧里東崗十九號劉建志）

【答】：一、南投縣龜仔頭等地有少數日本種甘柿栽培，現在永靖鄉五福村新高種苗園有幼苗出售，甘柿每株八元，牛心柿五元。（牛心柿是蒞柿）

二、嫁接柿苗栽種後約四年可開始結果，凡排水良好的土地都可栽培，在來種平地山地都適宜，但日本甘柿更適合山地。

三、在來柿有十數品種以牛心柿較佳。

四、柿的栽植距離一般為九五市尺×十五市尺。

五、雞糞和豬糞尿等都是果樹的良好有機肥料，可以多用。（張振甫）

水蜜桃種植三年即可結實

【問】：一、水蜜桃苗向何處購買，價格如何？

二、何時栽植距離如何，管理情形如何？

三、植至收穫時間多久？（臺東關山鎮公所郭樹）

【答】：一、水蜜桃苗現尚無處可購，如栽培地址適宜，可向山地農牧局請配無需價款。中興大學有代山地農牧局繁殖之水蜜桃苗。

二、管理情形可參照一般方法，冬季落葉後至早春發芽前均可種植，距離因品種，土壤肥瘠而異，可由四公尺至六公尺。

三、種植後第三年可以結實。（朱長志）

西印度櫻桃種苗每株一元五角

【問】：一、在最近出刊的十四卷十六期豐年農業信箱裏，彰化林先生問西印度櫻桃，據張先生答覆，現在嘉義農業試驗分所，已選出一甜味種，不知嘉義農業試驗分所，是否出售此種西印度櫻桃。郵購辦法如何？（楊盛德）


【答】：一、嘉義農業試驗分所甜味種西印度櫻桃幼苗，現已育成，每株定價新臺幣十五元，歡迎洽購，因郵寄運費極易損失，希自行前來取苗，隨身攜帶為妥。



裕隆牌

陸用柴油引擎

DE-6A型 7,5馬力 NT\$13,860.00



另有DE-4型 5馬力柴油引擎
均參加合作金庫實物貸款

請逕洽各地農會

裕隆汽車製造股份有限公司

臺北市信陽街十六號

石灰硫磺劑已落伍 進步的柑農友使用「コロナ」

「コロナ」是獨一無二的可濕性水和硫磺劑
(石灰硫磺劑的劣點)

1. 易生藥害
2. 塞傷噴霧器
3. 不可與其他農藥混合使用
4. 有效期間短促僅約14~20日
5. 攜帶不方便


(コロナの優點)

1. 全無藥害
2. 噴霧器可暢通無阻
3. 銅水銀劑以外之農藥均可混合使用
4. 有效期間悠長可達二個月以上
5. 攜帶便利

特效藥！
火燒柑、紅蜘蛛
銹病、象皮病

CORONA

可樂農



コロナ

(原裝進口供應)



本：兼商株式會社榮譽出品
臺灣總代理：經華貿易股份有限公司
臺北市民生東路232號 臺北市郵政信箱第1764號
電話：41206