

東部海拔千公尺可種蠶豆油菜

【問】東部海拔一千公尺之處，是否適合栽種蠶豆(馬齒豆)及油菜籽兩種。

二、該兩品種是寒帶作物或熱帶作物。收穫期多長，是否要噴藥用何種藥。

三、該田豆與油菜籽種植時行株距離如何。(臺東縣關山鎮公所郭樹)

【答】：一、東部海拔一千公尺處可以栽培油菜及蠶豆(馬齒豆)，惟生育日數會比平地為長。

二、這兩個作物不喜太濕，因此必需利用冬季栽培，收穫期間油菜約需一四〇天(包括育苗期間)蠶豆約需一八〇天，生育中會發生蟲害的，因此必須噴藥，即油菜主要蟲害有蚜蟲及小葉蛾，蚜蟲以五〇%馬拉松乳劑一千至一千五百倍液，小葉蛾以六、五〇 BHC 可濕性粉劑四百倍液可以防治，蠶豆主要蟲害有蚜蟲，潛蠅蟲及黑夜盜蟲等，蚜蟲防治法與油菜相同，潛蠅蟲以安特靈一千倍液，黑夜盜蟲以地特靈乳劑一千倍液可以防治。

三、油菜播種為九月中旬至十月上旬，行距五十公分(臺中特三號四十公分)，株距二十五至三十公分(臺中特三號十公分)蠶豆播種時期為九月下旬與十月上旬，行距五十公分，株距三十五至四十公分(林黨生)



水稻氮肥應分三次施用

【問】：一、水稻施肥量如何計算？

二、水稻施肥量是以三要素重量計算，或是以所合成成分計算？(嘉義縣竹崎鄉龍山村水尾仔二號許文明)

【問】：一、通常每分地施用硫酸四〇公斤過磷酸鈣二〇公斤氯化鉀十公斤。(氮八公斤)(磷三·六公斤)(鉀五公斤)但氮質肥料應分二至三次施用為宜，肥料用量應以三要素成分計算較妥，如氮素八公斤換算作肥料量是硫酸四〇公斤，或者尿素約十八公斤。(吳洛東)

嘉義後作宜種菜豆番茄

【問】：一、水稻後作之甘藷和甘蔗(九月上旬種)之間，想種一短期蔬菜作物以何種為有利而且容易成功。

二、如種新香瓜是否適合，八月中下旬收穫最遲應以何時播種？(嘉義縣鹿草鄉施定村四八號林政勇)

【答】：一、以實地之氣候條件而定種植矮性菜豆，加工用番茄(羅瑪茄)為宜。

二、新香瓜如欲八月中下旬收穫應在六月下旬播種。查實地之播種適期為二月上旬至五月下旬，十月下旬，故最遲應在十月上旬播種，以免一月中寒流侵襲本省時受害。(王進生)

【問】：一、雜交種鳳梨苗，臺農七號及二號何處有售？每株價若干？

臺農二號鳳梨 不耐貯藏

【問】：一、雜交種鳳梨苗，臺農七號及二號何處有售？每株價若干？

二、二號及七號那種肉質果比較多？(雲林縣古坑鄉溪鄉村吳脚一之一號陳文財)

【答】：一、雜交種鳳梨臺農七號及臺農二號，目前僅試驗機關栽培少數作為品種保存外，農家栽植者極少。

二、臺農二號較臺農七號肉質果多，但兩種部不耐貯藏。(黃季春)



南部可以種植大白杜蘿蔔

【問】：一、南部的氣溫是不是可以播種大白杜蘿蔔？

二、二分地種子多少？

三、畦面寬多寬，畦溝寬，每畦種幾行，距離多寬？(臺南鎮光和村五號劉榮文)

【答】：一、南部的氣候可以播種大白杜，播到十月。

二、二分地約需一·二公斤，二·〇公斤種子。

三、田間行距四〇公分株間十八公分為標準。(陳培島)

農友們蔬菜外銷年年增加

種植外銷蔬菜 請選購

丸種榮譽出品。字治交配脫普甘藍。字治交配USM一號甘藍。坂田榮譽出品。坂田交配三季時中學生甘藍。坂田交配黑葉理想甘藍。坂田榮譽出品。坂田交配濱光結球白菜。八江榮譽出品。新黑田紅心五寸人參。黑田紅心五寸人參。

(胡蘿蔔外銷琉球、日本，數量頗巨，此品種最適宜該地需要品種、色澤、口味均比較已在臺灣種植的美國、日本種為優)其他長岡一號甘藍、長岡陽春甘藍、長岡秋時中學生甘藍、抱子甘藍、紫色瑞典蕪菁、各種交配蕃茄、包心萵苣、日本花不知時無大根、日本黑葉系美濃早生大根、北京劍葉結頭菜、繪袋裝草花種子、及日本美國秋時種籽全部入貨。

◎各種日本果樹苗歡迎預約採購

秋季蔬菜 種子價格表 函索即寄
輸入 臺灣農產企業公司 經銷 臺灣農業資材公司
臺北市迪化街一段八十六號 電話：四四二五三·四三六五 劃檢儲金：一·二七九

最新改良新品六月桶柑苗

- ◎六月桶柑有六大特點◎
(1) 六月桶柑採果期五月至六月間。
(2) 六月桶柑三年可生產。有子實。
(3) 六月桶柑果粒大，沒有子實。
(4) 六月桶柑果汁豐富，氣味芬芳。
(5) 六月桶柑果皮容易剝皮，適合製罐多受罐頭工廠歡迎。
(6) 六月桶柑採收後，是臺灣特產品，可以輸出外埠，爭取外匯，保證書可以負責，保證母樹園可以參觀。歡迎各界農友有本農場參觀，特別優良與美麗每株二尺半以上只售十元。

興農記農場

連絡處：臺北市中山北路二段183巷4號之12 電話：50209

