防治柑桔紅蜘蛛怎樣最有效？

煥

柑桔紅蜘蛛是一種微小的柑桔害蟲，初期發生不易引人注意；但環境適其繁殖時很容易猖獗成災，影響柑桔生育和果實品質很大。柑桔紅蜘蛛繁殖迅速，一年有十數世代；尤其在天氣乾燥時期，發生密度最高，冬天氣溫低，紅蜘蛛活動力減弱，但並不影響其生存，爲次年發生的根源。

經常巡視果園　注意選用藥劑

紅蜘蛛的防治，要注重預防，本省農友過去都在紅蜘蛛大發生時，才着手噴藥防治，致使植株或果實受害，如用藥再不適當，一時不易收到理想的防治效果，所以，最好經常巡視果園，發現有少數紅蜘蛛爲害時，即應把握時機噴射藥劑。

其次應特別注意前後藥劑使用之配合，及選擇有益的藥劑使用，因爲某些藥劑用在柑桔樹上，對紅蜘蛛不但無效，而且可能引起「爆發性」的發生。如波爾多液，賽文、DDT、BHC、靈丹等，這些藥劑對紅蜘蛛無效或效力不大，但對紅蜘蛛的天敵，如寄生菌或捕食性益蟲等，具有强毒，甚或有的可刺激紅蜘蛛的繁殖，所以如須使用此等藥劑，最好和殺紅蜘蛛的藥劑混合使用。

有機磷殺蟲劑　不易殺滅蛛卵

有機磷殺蟲劑，如巴拉松、馬拉松、大利農、大滅速、米賜多愛（美果素）、益加津等都是殺蟲兼殺蜘蛛藥劑，對紅蜘蛛的成蟲、幼蟲確有相當效力，但對卵的毒效都不理想。而對捕食性昆蟲具殺傷力，而對紅蜘蛛殘餘毒性短，尤其對殘存卵再孵化的幼蟲失去效力；所以在噴藥後十天內不再行噴藥時，不但不易達到理想的防治效力，且有使紅蜘蛛發生更爲迅速的趨勢。

鐵定旺開路生　專門殺紅蜘蛛

本省目前使用的鐵定旺、開路生、克氣苯等是專門防治紅蜘蛛藥劑，其中以前兩種使用最多，效果也較爲可靠；二十%鐵定旺可濕性粉，通常使用倍數爲一千倍，優點是對紅蜘蛛的卵，幼蟲有優良效果，殘留毒效長，不傷天敵，無藥害，可和任何殺蟲、殺菌劑混合；但對成蟲效果不顯著，爲最大缺點；此藥適於紅蜘蛛初期發生或預防發生之用，如果紅蜘蛛已大量發生，使用此種藥劑，須加對成蟲具速效藥劑或於使用後隔二—三週後再使用一次方能達理想之效果。十八•五%開路生乳劑通常使用五百倍較高濃度防治效果較優，對卵、幼蟲、成蟲等各期效果均確實而迅速，對人畜及有益昆蟲僅具微毒，正常使用不致發生藥害；此藥適於紅蜘蛛已形猖獗爲害之防治。但其殘效較短，不能與一般鹼性藥劑混合使用爲其缺點。

臺灣省農林廳農藥登記證農藥字第381號
審定商標中臺字第19124號
聯合商標註册號數臺字第9724號

▲最新水稻紋枯病驅除用液劑▼

ネオアソジン®

新阿蘇仁液劑

▲使用イハラ農藥　可使你年年豐收▼



日本原裝

製造元：日本イハラ農藥株式會社

進口商：靜興企業有限公司

地址：臺北市承德路83號三樓　電話：51023 52023

現貨供應：年豐農藥行　翁博鈿
嘉義縣義竹鄉六桂村199號　電話：義竹局24號

聯豐行　翁博裕
屏東市民生路194號　電話1359號