怎樣育成優良的柑桔苗？

栗鴻蘭

要想育成優良的柑桔苗，第一要選擇好的接穗，第二要有熟練的切接技術，第三要注意苗期的肥培管理。現在分別說明如下：

優良接穗的選擇

優良接穗應自優良母樹上採取，優良母樹則應具備如下的標準和條件：

（1）樹齡：母樹的年齡，以十至十五年生爲最佳。

（2）樹勢：生育强健，無病蟲害寄生，尤應注意附近無黃龍病株，樹勢的重要估選定標準的三十%。

（3）產量：每株每年須產果百顆以上，並須具有均勻的年產量。產量也佔選定標準的三十%。

（4）果實：果實須有符合標準的糖酸比率和貯藏力。按照標準，對果實的要求如下：

①果高和果寬各六至七公分。
②果重一百五十至二百公克。
③果皮厚二至四公厘。
④果囊數十至十二片（大小整齊）。
⑤種子：〇至十粒。
⑥果汁數量八十至一百公撮（CC）。
⑦果汁糖度十至十五度。
⑧果汁酸度〇・八至一・二%。
⑨最低糖酸比爲八比一。品質佔選定標準的四十%。

切接成功的秘訣

①切接位置，原則上都是選光滑的部位，如果切接部位向陽時，多不容易成活。經實地試驗證明，把握背陽光部位行切接，成活率可提高到九十%以上。現在包紮材料改善，切接後受降雨的影響已經不大。

②切接一月以後，如果氣候過度乾燥，應時常洒水。每月還要施用淡薄牲畜糞便一次；如改用豆餅、花生餅也可以，但是化學肥料不宜多用。

③切接發芽後，立即噴射「馬拉松」二千倍液一次。以後每在新芽發出時，重行噴射一次。

育苗肥培的重點

①播種：立春以前作畧，施用淡薄牲畜糞便，經一週後播種。種子上覆蓋燒土，燒土上再蓋稻草，發芽後取去，施用淡薄牲畜糞便，同時噴射「馬拉松」二千倍液。此後每一至二月施用淡薄牲畜糞便一次，化學肥最好不要使用。

②移植：播種一年後移植，移植時剪斷主根，栽植在另外準備的畦上，株距二十公分，行距三十公分，移植後的管理和播種後的管理相同。

③切接：移植管理一年後，在立春前後，在砧木離地面七公分處剪斷，施行切接。

請認明拜耳
商標為品質
高超之標記

BAYER

請用 樂農家 防治

果樹・蔬菜
小麥・於葉
等各種病害



現貨供應
興農化工股份有限公司
地址：臺中縣大里鄉內新路五十九號
電話：二六一九・四六八八
臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號
電話：三八八二六

臺灣總代理
中德貿易有限公司農藥部
地址：臺北市博愛路九十八號
電話：三三一五七
三三一五八
三三一五九