

蕉園可間作子實(加工)豌豆！

施銀行

子實豌豆(加工豌豆)營養豐富，適合國人嗜好，除製作(請參看十四卷十七期和十九期)外，還可以和甘蔗間作栽培，是一種有利的作物。適合子實用豌豆品種，有下列三種：

Laurel：中早生，產量多，生長強健，株矮，分枝少，蔓長約六十公分，葉色濃綠，種質大，品質好，青豆仁一百粒重約四十八公分。播種後約六十天可開始收穫，收穫期間約二個月。須較密植，適合和甘蔗間作。

罐王(Canner King)：子實最大，品質良好，生育旺盛，豐產，稍晚生，植株較大，分枝稍多，蔓長約七十五公分。青豆仁一百粒重約六十二公分。播種後約九十天開始收穫，收穫期間一至二個月。

百富(Perfection)：生育強健，豐產，品質好，稍晚生，植株較大，分枝稍多，蔓長約八十公分，青豆仁一百粒重約四十四公分，播種後約九十天可開始收穫，期間一至二個月。

(Laurel)

(罐王)

(百富)



播種適期自九月下旬至十一月中旬，太早播種氣溫高，初期生育不良；太遲播種產量差。照目前情形看來，愈早上市，價格愈好，所以最好盡可能提早播種，並採用較早生品種，比較有利。

行距六十至九十公分，株距二十至三十公分。如和甘蔗開作，須撒播於畦間。生育初期土壤須保持適度水分，如過乾必須灌溉。

豆莢已經包滿而顏色尚呈綠色，莢面稍現出皺紋時採收，連莢出售。每十公畝地(一分地)帶莢產量約五百至八百公斤。

重要病蟲害有豆潛蠅、潛葉蟲和白粉病等。豆潛蠅在生育初期比較高溫時發生多，幼蟲潛蝕莢根內部嚴重時會全部受害枯死。生育初期應噴「富特靈」一至二次防治。潛葉蟲在生育中後期發生多，危害葉部，使植株衰弱，影響產量很大，可噴「馬拉松」八百倍液防治。

白粉病在生育中後期發生較多，可噴射「可利生」防治。

美國聞名雅克斯利洋菇研究所多年研究之結晶

假冒必究

世界洋菇協會公認之真正


中央標準局註冊商標
第14974號

洋菇專用綜合營養劑

美世農
MYCELON



包君滿意



保證無藥害

一石三鳥之珍藥 (對菇農好，對菇廠好，對國家好)

- ①係真正洋菇專用劑(與普通植物荷爾蒙劑或其他類似改良劑性質大不相同)
- ②鐵的事實！增收35%—85%(有各地收菇記錄可稽)然每坪只多化三元八角。
- ③經各農會各大商會各大栽培場實地使用而頗受好評又愛用已三年之久。
- ④菇質粗大堅實而重，純白，無畸形之一級洋菇，菌絲生長正旺盛而有力，發菇普遍而均勻，對南風冷氣，水傷病害等有相當之抵抗力等等(至於詳細請另索閱說明書)
- ⑤於翻箕時施用較早施用效果愈大。(最遲於藥床前施用)

限在農會配銷 總經理：太原工業原料行 臺中市繼光街132號 電話：3543

◎本行另備批零售日本原裝附比色表 B.T.B.試驗紙，輕重質炭酸石灰，福美林，DDVP乳劑及其他各種栽培材料應有盡有

栽菇成功之秘訣

栽菇必備之寶藥