


瓜西型小的厚利輕本



郁文陳

小型西瓜就是果重在一公斤左右，品質良好的食用小西瓜。這種西瓜因為植株小，生育期很短，所以栽培資本少，且可利用水田裏作及其他作物之閒作或家庭菜園等的栽培。又因為可提早生產時期應早市，果形和品質優美，攜帶亦很方便，可如其他水果裝於小籃內作為贈送禮物，所以銷路良好，栽培利益很大。

優良的品種

「新少女」：以原來「少女」西瓜分離之二個優良系統，經交配選出之一代雜交品種。果皮綠色，果面光美（原少女西瓜果面較為粗糙），果實高球形，每果平均重量在一公斤左右，果肉鮮紅，肉質很渣爽（原少女西瓜肉質較為粗硬），甜度高，風味良好，又種子少而小（原少女西瓜種子多而大），皮薄品質甚優美，瓜蔓生長力強，莖葉細小不甚繁茂，抗病力及結果力甚強，栽培容易。是為小型西瓜品種結果最快，熟期最早的優良品種。

「小寶」：以少女西瓜的優良系統與美國輸入之小型西瓜（Jonson）交配選出之一代雜交品種。

果皮淡綠色，果實近球形，每果平均重量約六百至八百公分，果肉深紅色，果肉不易崩裂，種子少而小，品質良好，植株小，抗病力特強，結果力亦強，果實甚耐貯運，適於遠市販賣用的栽培。

「小鳳」：以小型西瓜三十二號及三十七號二個優良系統交配選出之一代雜交品種。植株生長快速，分枝多，抗病力及結果力都很強，一株可產十果以上。果皮淡綠色間有濃綠色的條紋，果面很光美，果實近球形，每果重量約五百至六百公分，果肉蛋黃色而嫩爽，甜度高，且有芳香，果皮薄弱不耐運輸，但果肉不易崩裂，品質風味均比日本輸入之「小玉西瓜」良好。

「小鈴」和「小紋」：以嘉寶西瓜之突變系統分離純化後交配選出之一代雜交新品種。果型和嘉寶西瓜相同，但小鈴較小，果重約五百至八百公分，「小紋」較大，果重約一公斤左右；果皮「小鈴」為淡綠色，「小紋」為淡綠色間有濃綠色的條紋，果面光滑美麗可愛。果肉橙紅色，比嘉寶深鮮引目，肉質渣爽，甜度高，且有香氣，種子少而小。小鈴的種子為紅色，小紋為黑色，品質風味均比嘉寶西瓜優美。抗病力甚強，結果力亦強。種子擬待今年秋作試作後於明年春季繁殖推廣。

適地和播種

小型西瓜和一般大型西瓜一樣喜歡溫暖乾燥日照充足的氣候；在寒冷時生長衰慢，陰霧多雨時病害容易發生，日照不足時開花結果不良好。

播種期北部三月至八月，中部二月至九月，南部二月至十月。南部可利用水稻裏作及甘蔗田的閒作栽培。


播種前種子先用一千倍「收祿生」乳劑浸漬三十分鐘後用清水洗淨，再將種子浸水（不可用溫水）八小時左右，然後取出種子包於濕布內放在攝氏二五度至卅度左右的催芽。催芽期間約二天，但新採種子需要四天左右，種子幼芽長出○.五公分左右時為播種最適期，幼芽過長者容易傷害芽根，且播種不方便。催芽前應先要整地準備播種。

溪床砂地作平畦，田地作高畦，畦寬二公尺，

水稻蟲害特效藥滲透性最強



持久性
速效性



福利農乳劑
利農松乳劑

50%巴拉松乳劑
47%巴拉松乳劑
19.5%
安特靈乳劑
50%馬拉松乳劑
大東殺鼠劑

中華民國五三年八月二十六日
謝即農友之鼓勵與指導

大東元化學工業股份有限公司

大東元公司台鑒：貴公司出品之巴拉松乳劑，自上市以來，深受農友之歡迎，銷路廣闊，成績斐然。茲為擴大推廣起見，特將該項乳劑之售價，由原價每公升一元二角，減至八角，以資鼓勵。此項減價，自即日起開始，至明年三月止。凡購用該項乳劑者，請向各經銷商洽購，或逕向本公司訂購均可。此致。大東元公司總經理 謝即農友 謹啟

大東元化學工業股份有限公司

臺中市西區三民路一段九七號 電話：四六七七七號

輔助飼料界的生力軍出現了
優異驚人的效果！

REKUFAC

Feed Supplement

立刻肥

綜合強力輔助飼料

(リイックフェック)



●本品使肉質好瘦肉多皮薄肉細

●獲得厚利的途徑請採用本品

(最新鐵罐包裝)

- 預防一切疾病 迅速發育長大
- 使受精率提高 母禽乳量富足
- 產蛋增加粗大 軟蛋殼症消失
- 節省人力飼料 增生產早獲利

說明書樣品備索 附郵一元即寄

徵求各地經銷處

安祥興業有限公司

通訊信箱：臺北郵政第三二五〇號信箱

肥料名	總用量	基肥	第一次	第二次	第三次	第四次
堆肥	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
硫酸銨	20	20	20	20	20	20
過磷酸鈣	20	20	20	20	20	20
氯化鉀	20	20	20	20	20	20

上表是普通田地的施肥量，如為溪床砂地應稍

小型西瓜因為生育期間短，施肥量約大型西瓜的三分之二左右。每分地的肥料用量如左表：

施肥和灌水

每一畦栽一行，植距一、二公尺，每一植穴栽二株，十公畝地約栽四百植穴，共可栽培八百株左右。面積小的家庭菜園可用行距八十公分，株距每四十公分栽一株，利用支柱引蔓栽培。

留果和管理

播種至第一雌花的開花期約二五天至三十天，第一雌花開花時因植株發育尚弱小，果實發育不好，且會影響以後的結果，故應早摘去，但第二花果以後應任其開花結果。支柱栽培的宜在母蔓四葉摘心，然後留三支發育好的子蔓，並擇支柱引蔓使其結果，一蔓可採收二果左右，果實肥大後應用小線網吊起果實，免使它落掉，無支柱栽培者每株可結

增加，而肥沃的土地稍減少。基肥在播種三天前施入與土充分混合整地以待播種。追肥第一次在本葉一至二葉時澆水灌澆，第二次在本葉六葉左右時，第三次在第一雌花開花時，第四次在第三雌花至第四雌花開花之間，開淺穴施於離根部三十公分以上之處。

灌水宜在清晨施行，因為小型西瓜的結果數多，且果皮薄弱，生育初期至開花結果期可照一般大型西瓜施行灌水，但結果期至成熟期宜減少灌水量，以提高結果率並防止裂果。

採收和販賣

小型西瓜自開花至成熟，如在溫暖期約需二十天，在冷涼期約需二十五天左右。採收期間約十五天左右。近市販賣的應採九分熟者，遠市販賣的應採八分熟者。採收時宜在傍晚，用小刀割取；採收後的果實輕輕用乾布擦淨果面，最好每一果實貼上美麗的商標紙，再用薄白紙包起，裝入箱或籃子運銷。在室內的果實貯藏期間約七天左右，過久雖不腐爛，但品質風味不良。食用時將果實切成二大片，用湯匙取食最為衛生且方便。

(種子現在鳳山第二市場內農友種苗店有售)

六至十果。

畦面應多敷草以固定瓜蔓不致被風吹動翻轉，並防雜草的繁茂及果實的腐爛。又瓜果在開花後二星期左右時，應輕輕翻轉一次，以免瓜果成熟時接士部份的果皮粗糙而色澤不良，影響商品價值。(但支柱栽培者不需要)。