

輔助飼料界的生力軍出現了
優異驚人的效果！

REKUFAC

Feed Supplement

立刻肥

綜合強力輔助飼料

(リイックフェック)



●本品使肉質好瘦肉多皮薄肉細

●獲得厚利的途徑請採用本品

(最新鐵罐包裝)

- 預防一切疾病 迅速發育長大
- 使受精率提高 母禽乳量富足
- 產蛋增加粗大 軟蛋殼症消失
- 節省人力飼料 增生產早獲利

說明書樣品備索 附郵一元即寄

徵求各地經銷處

安祥興業有限公司

通訊信箱：臺北郵政第三二五〇號信箱

肥料名	總用量	基肥	第一次	第二次	第三次	第四次
堆肥	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
硫酸銨	20	20	20	20	20	20
過磷酸鈣	20	20	20	20	20	20
氯化鉀	20	20	20	20	20	20

上表是普通田地的施肥量，如為溪床砂地應稍

小型西瓜因為生育期間短，施肥量約大型西瓜的三分之二左右。每分地的肥料用量如左表：

施肥和灌水

每一畦栽一行，植距一、二公尺，每一植穴栽二株，十公畝地約栽四百植穴，共可栽培八百株左右。面積小的家庭菜園可用行距八十公分，株距每四十公分栽一株，利用支柱引蔓栽培。

留果和管理

播種至第一雌花的開花期約二五天至三十天，第一雌花開花時因植株發育尚弱小，果實發育不好，且會影響以後的結果，故應早摘去，但第二花果以後應任其開花結果。支柱栽培的宜在母蔓四葉摘心，然後留三支發育好的子蔓，並擇支柱引蔓使其結果，一蔓可採收二果左右，果實肥大後應用小線網吊起果實，免使它落掉，無支柱栽培者每株可結

增加，而肥沃的土地稍減少。基肥在播種三天前施入與土充分混合整地以待播種。追肥第一次在本葉一至二葉時澆水灌施，第二次在本葉六葉左右時，第三次在第一雌花開花時，第四次在第三雌花至第四雌花開花之間，開淺穴施於離根部三十公分以上之處。

灌水宜在清晨施行，因為小型西瓜的結果數多，且果皮薄弱，生育初期至開花結果期可照一般大型西瓜施行灌水，但結果期至成熟期宜減少灌水量，以提高結果率並防止裂果。

採收和販賣

小型西瓜自開花至成熟，如在溫暖期約需二十天，在冷涼期約需二十五天左右。採收期間約十五天左右。近市販賣的應採九分熟者，遠市販賣的應採八分熟者。採收時宜在傍晚，用小刀割取；採收後的果實輕輕用乾布擦淨果面，最好每一果實貼上美麗的商標紙，再用薄白紙包起，裝入箱或籃子運銷。在室內的果實貯藏期間約七天左右，過久雖不腐爛，但品質風味不良。食用時將果實切成二大片，用湯匙取食最為衛生且方便。

(種子現在鳳山第二市場內農友種苗店有售)

六至十果。

畦面應多敷草以固定瓜蔓不致被風吹動翻轉，並防雜草的繁茂及果實的腐爛。又瓜果在開花後二星期左右時，應輕輕翻轉一次，以免瓜果成熟時接士部份的果皮粗糙而色澤不良，影響商品價值。(但支柱栽培者不需要)。