

### 蕃石榴加工甘草拔先泡明礬水

【問】：擬將出售未完的蕃石榴作甘草拔煩請指導甘草拔的加工法。(桃園鎮東埔里九鄰四號江榮發)

【答】：蕃石榴加工品「甘草拔」是用未成熟的蕃石榴和甘草加工調味者。其方法是蕃石榴用剝皮刀剝去外皮後，放稀薄之明礬水浸漬和洗滌，以防止變色，保持鮮度，然後放入一種旋轉式圓筒器內，加入少量食鹽以手搖轉動攪拌之，以增加製品脆度。

若自家少量製造時，可用普通竹盤或磁製容器，將原料蕃石榴和鹽，放在一起磨碎數遍，使鹽分均一和增加脆度。最後加點甘草粉(也可用甘草汁)調味便可得製品。(宋仙和)

### 栽培柳橙應採用根接法

【問】：一、栽培在平地的三年生柳橙柑，患過橘腐病，為補缺根，要用那一種苗木較適宜。

二、嫁接及根接採用那一種方法較好。成活率如何？(嘉義縣鹿草鄉松竹村一三五號林明傳)

【答】：一、經腐病害柳橙株之根接用砧根，可使用酸柑或廣東檸檬苗木。

二、嫁接與根接兩種方法比較起來，靠接法雖作較簡易，但成活後之生長緩慢，不適當採用，應採用根接。

三、兩者成活率均高，如在立春前後施行之，百分之百可能，十至十一月間仍有七十多以上之成活率。(翁仁祿)

### 想增加種柳橙常識怎麼辦

【問】：一、敝人於去年冬天栽種約六百株柳橙，至現在生長情形大部份很繁茂長出許多新枝葉，但是還有少數生長不良者，恐係因本人缺乏栽種柑桔果樹之經驗，管理上疏忽。恭請介紹有關柳橙栽種法，如施肥，病蟲害防治之專門書刊，供我購買參考使



用，感謝不盡。(鄭旺校)

【答】：一、關於柑桔栽培之書刊有：「怎樣改進柑桔生產」乙冊，適合初栽培者之參考，可向當地縣政府建設局或青果合作社詢問。(翁仁祿)

### 桶柑不宜施用過量氮肥

【問】：一、敝人種植桶柑於海拔約六百公尺的山地至今已七年整，樹勢非常繁茂，但一樹生產只有幾個，是何原因？

二、海拔六百公尺的山地，可種植何種比較高貴耐搬運的果樹？(宜蘭市慶和街三九號楊鵬海)

【答】：一、桶柑以秋芽為接穗嫁接者，樹勢旺盛但第一次結果期間較長。又栽培地富有機物質，且年年施用多量氮素肥料時，因促進發育易奪取植株內貯蓄之碳水化合物，致花芽不分化。需減少氮肥量及行間拔修剪，剪去部份分枝側枝並加枝條誘引工作，抑制發育，以謀結果。

二、宜蘭縣內六百公尺附近之山地，適於種植桶柑，溫州密柑，枇杷等果樹。(翁仁祿)

### 山地大梨晚熟、怎麼辦？

【問】：一、本人所植山地大梨(每顆平均一畝斤以上)因晚熟在九月中旬至十月初旬始可收穫，因受颱風災害擬改採早生種日梨(如新世紀等)因樹身直徑約三寸左右，是否可改接？改接時用何種接法較宜？改接時高度(離地面)如何？改接後是否會變種？

二、蘋果在海拔一千三百至一千五百公尺處可否種植？可種植者採用何種蘋果前較宜？(南投縣仁愛鄉發祥村瑞和路十七號施性發)

【答】：一、大梨可以改接其他品種，可在大枝上改接，每枝上可接二個接穗，用切接法或割接法均可，離地愈低愈佳，以免遭受風害，改接後品種不會變。

二、蘋果在一千三百至一千五百公尺高度，不宜種植，因生長及結果均不良，候將來有適合品種時，再行函告。(宋長志)

## 福利來

享譽已久 公認的效力



Furella  
'フレラ'

新貨已到 即請購用

育雛好消息!!

## 八折大優待

鷄白痢的特效藥「福利來」為供應新雛育成的成功特別實行八折大優待。每雞一箇月祇花八角藥費，保證百發百成，既可安心又可獲利。

「說明書備索」

總代理：英商卜內門洋碱有限公司  
臺北市中正路一八〇〇號  
經銷處：國際家畜藥物廠  
臺北市長安東路一段三九號

各地 均售

## 農友們您想栽培秋冬二季之各種優良蔬菜嗎!!

請向嘉義豐盛種子行選購種籽信用最可靠的，能使您們得到滿意之收穫。

現種植豐盛特選早中生三十五天黑葉包心白菜使您賺錢，長岡交配一號甘藍，交配暑冠甘藍，海谷三池中生甘藍，長岡交配六十日白菜，長岡交配理想白菜，長岡交配二號白菜，正晚生60天黑葉包心白菜，天津竹筒青白菜，正北京劍葉結頭菜，紫皮瑞典燕菁，加州大粒甜椒，中生晚、正晚生花椰菜，雲南大頭菜，四川榨菜，正赤葉大包包心芥菜，正孛粉甲大心芥菜，美國大型五寸人參，日本改良大型五寸人參，正南畔州長種梅花春菜頭，正烏山扁圓型豇仔薯(劉薯)，各種胡瓜(荊瓜)，改良矮性皇帝豆，日本各種交配蕃茄(トマト)，其他各種蔬菜種籽，貨色甚多，歡迎函詢賜顧。

各種蔬菜種籽價目表函索即奉寄

## 嘉豐盛種子行

嘉義市中正路五一四號·劃撥儲金嘉字八〇九六〇號