

果樹施藥後一星期才可採食

【問】：一、五至十年生果樹(楊桃及芒果)間隙中種有樹薯等作物，其果樹還需要單獨施肥嗎？

二、楊桃樹果被蟲咬甚多，以何藥救蟲，如何用藥？

三、芒果以電土處理後，表皮不黃，流汁甚多，是否處理欠當？(蔡彪)

【答】：一、樹薯吸收土壤中肥力之極強，最易耗損地力，不宜與果樹間作，以免影響果樹生長，現在既已間作，就應對果樹充分施肥。最好，果樹間作是豆類植物如花生、蠶豆，及其他綠肥作物等。

二、預防果實蟲害不可用D.D.T.地特靈，安特靈等以免食後中毒，最好用馬拉松，或賽文，因為這些藥劑的毒性較易消失，但仍應在噴藥後一星期才可採食。



三、芒果果實到九成熟時採收，用電土處理可以追熟，過生採收者則無追熟效果。(張振市)

文旦、柑橙果皮變黑 是銹壁虱為害

【問】：一、文旦果皮生銹是什麼病？

二、發生此病原因如何？

三、用什麼藥可能治療？

四、防治方法怎麼？(臺南縣白河鎮仙草埔吳振村)

【答】：一、是銹壁虱為害，可參考下列林火炎先生問。

【問】：一、本人種植五年生甜柳橙三百棵有部份果實皮(附樣本)變黑褐色是何原因？

二、對於甜柳果實之害蟲椿象(吳奇龜)本人用十四公升水加25cc馬拉松噴射未見效果，應改用何種藥，才能殺死消滅？(臺東鹿野鄉瑞豐村二八鄰二號林火炎)

【答】：一、你所寄來的甜柳果是受壁蝨為害，且已非常嚴重，整個變黑硬化，故應立即採用下列藥品防治①大生乙8或

M22一千倍。②二十五克氯苯一千倍③石灰硫黃合劑八十倍。(可任選一種施用)，這如有紅蜘蛛同時發生，可用第①或②項藥劑，可一並防治，每年六至十一月為銹壁虱發生盛期，故應每一至二月施藥一次。

二、柑桔椿象用馬拉松效力較差，可用五十倍賽文可濕性粉五百倍或五十倍大滅速一千倍，或五十倍大滅克隆一千倍防治效力較好。(張良傳)

蘇水河寄來害蟲標本是蛇目蝶

【問】：本人在田裡去雜去穢時發現一種水稻害蟲，今把幼蟲寄上鑑定，該蟲頭上生有觸角一對胸足三對腹足五對，尾端生有針狀尾刺二枚背上並有短毛，幼蟲沿葉緣食害，食量驚人且抗藥力強，請問這是什麼蟲？應如何防治？(彰化市竹巷里三六號蘇水河)

【答】：所寄來之稻害蟲係條蛇目蝶幼蟲，該蟲除為害稻外尚加害甘蔗及麥類，本省尚少有大發生，最近中部曾有局部大發生，可能是歷年使用巴拉松對該蟲效力差且殺死其天敵，致失去自然平衡狀態使然，蟲卵一粒一粒產在葉上，幼蟲食葉片，老熟後就將尾端粘附於葉背，頭下垂化蛹，成蟲是大型蛾黃褐色或灰褐色，前翅有斑紋如蛇眼，故名蛇眼蝶，此蟲對巴拉松抵抗力較強，可試用賽文可濕性粉五百至一千倍或二五D T五百倍。(張良傳)

臺中特三號油葵雖早熟但低產

【問】：一、油葵臺中特一號、臺中特三號、新竹特一號、那一種是早生？那一種產量較高？(彰化埔鹽鄉南港村埔港路五號徐慶樹)

【答】：油葵臺中特一號、臺中特三號、新竹特一號三品種中，臺中特三號最早熟(生育日數約一〇〇天左右)，新竹特一號次之(約一三〇至一三五天)，臺中特一號較晚熟(約一三五至一四五天)，惟產量方面臺中特一號最高(每公頃約一、八〇〇至二、五〇〇公升)，新竹特一號次之(一、五〇〇至二、〇〇〇公升)，臺中特三號因早熟最低(一、二〇〇至二、〇〇〇公升)(林蕙生)

確保豐收請用 (葉面撒布劑)

檢核局許可是檢字第四〇〇五五號

(成分正確效果確實)

最新速效綜合植物營養素

混合液體肥料

函索即寄 說明書

提早發芽	發根迅速	防止落果	健全品質
葉茂枝繁	發育健全	改善品性	提高市價
預防病害	豐富收成	增加產量	
預結實充	提早收成		

(全省鄉鎮農會農藥行均有售)

技術 臺灣植物營養科學研究所 製造

臺灣植物營養股份有限公司

彰化縣北斗鎮元市街五四號 電話40號

綠肥兼 飼料用 紫雲英 高脚 種子

種子生產原始地信用可靠

新鮮純潔保證高脚現貨供應

樣品說明書備索請慎重比較

請注意：外產矮脚種紫雲英種子進口上市了敬請慎重選購。

許源發種子行

臺北縣樹林鎮鎮前街二十七號之三

電話：樹林一七一號

郵政劃撥儲金五四〇九號

農友們增加你的收入請選購興農的優良種子

預約開始：美國美麗華盛頓蘆筍種子

紫皮黃肉瑞典蕪菁(美國 Purpee 公司所產半磅原封罐裝)

興農飼料蘿蔔

興農大梅花

秋季播種之各種子已入貨了!

詳細請閱一九六四年秋季興農園藝新知識函索付郵二元即寄

輸入元

林興農行股份有限公司

興農種子行

本行 臺北縣三重市重新路三段一〇八號

電話：九七一、二六三、四

劃撥儲金一四〇二八號

豐原鎮中山路二八二之一號