

# 農友經驗

## 越瓜甘藷芥菜輪作好

我利用蒙雲英的採種田，先施下堆肥。隔五天，造平畦，在邊溝播種。早生越瓜，待本葉五片時即行摘心，兩邊開好溝，施用一—二—三的二要素作追肥，中溝灌以既肥，便插入臺農五十七號甘藷苗，苗要長一點，插好後順手拔草，照常管理。

待瓜收起，把瓜蔓捲成一束束，然後培土做成諸畦，另外預留一些空地，播種大心芥菜，育苗待移。因為五十七號甘藷成熟很早，如管理得好



號游山宮) 友農山游 收提 (一) 里美溪桃 二華鎮大園 之一

## 宿根甘蔗間作花生


今年二月間，我種的甘蔗採收後，立刻整地，在畦中央間作臺南七號花生一行，六月間收成，估計每公頃收穫乾莢果七百五十公斤，而且花生的枝葉又可撒入田裏充作綠肥。我的耕作方法如下：

田間整理時，把甘蔗的枯葉和殘莖全部搬離現場，製造堆肥可以減免

風害。另外，每公頃用一萬公斤的腐熟堆肥，過磷酸鈣一百公斤，氯化鉀五十公斤，施入田間，用牛

拖小型刈耙，使肥料和土壤拌和，然後開溝播種，每隔十公分，播下飽滿種子一至二粒，播種前把種子浸在千分之二「烏斯普龍」溶液中一至三小時可使發芽整齊。並且每公頃種子拌和四公分的「西樂生」預防凋萎病。

平時，除了要勤於中耕除草外，並且在開花盛期即播種後四十五天，要灌水一、二次。(嘉義縣民雄



友農吉秋賴

## 牛誤吃頭髮會起咳

現在農村家庭差不多有十分之六、七養有牛隻，農友們常把牛趕到田邊吃草的時候，不小心吃到了別人的作物，農作物的主人為了報復，會到理髮廳拿了許多頭髮，在田邊的作物上亂散，我們放牛人不注意的時候，趕上又吃到了，牛會發生咳嗽，我們用圍裏的竹葉來給牛吃，吃過了一



友鎮來黃

、二天的時間就會好了。(彰化縣埤頭鄉興農村埤頭路一〇四號黃鎮來)




# 新太豐收 乳劑

Phillips Duphar M-parathion E.C.

## ROXION® 20%·50%E.C.

樂可信乳劑 (大滅速)

## Cron 90% W.P. (クロン)

克龍水和劑

連勝貿易有限公司

臺北市太原路20號 電話：50669號