母猪大肚子後又消去、是什麽道理？

【問】：我有一頭猪母是自己新留的。交配後在一百十六日看起來是要生產的樣子，也有下乳，可是沒有生什麽，肚子自己消去，請問這是什麽原因？（雲林縣褒潦鄉架仔頭二五號周忠助）

【答】：按來信推想，你所養的母猪是死胎（胎兒在死在腹中）此原因甚多，如①飼養管理之不善或②染病，傳染病可能爲起因於「日本腦炎」，第一胎的新母猪最易患此病，發病率很高對小猪生產損失亦嚴重，但以後，就獲得免疫，甚少再發生。死胎慢慢被吸收，變「木仍伊」影響而後生產，故應請獸醫將其排出，方能生產第二胎。（張聯欣）



猪的眼病種類甚多治法不同

【問】：敝人所飼之仔猪，患眼疾，猪之眼疾醫疾方法如何？（已養七月，患眼病後兩眼無發炎及紅腫現象，但左眼已視線不清，右眼能見度亦差）應用何種藥物，何處有售？（新竹縣芎林鄉上山村一一一號葉思榮）

【答】：猪眼病種類甚多，據來信說無發炎及紅腫，而視線不清等，可推斷爲下面幾種病，①維生素缺乏，②白內障，③綠內障，或視神經障碍性盲症等，但爲確實起見仍請獸醫診察爲宜。

白內障，綠內障，視神經障碍引起的盲症等眼疾治療甚困難，維生素甲缺乏引起者可以使用維生素甲或魚肝油醫治。（張聯欣）

水稻品種沒有屏東十號

【問】：一、屏東十號稻種在中部產量不知如何？什麽土壤比較好，插秧後幾天就可以收成？

二、臺南一號稻谷插秧後幾天就可以收成？（臺中縣大肚鄉王田村六十一號楊伯猌）

【答】：一、所問屏東十號水稻品種，因無此名稱之品種，想可能爲高雄十號之誤。高雄十號係舊品種，臺中地區並無推廣過。高雄十號一、二期作產量均較臺中六五號爲低，生育日數兩品種相差不多，但草較臺中六五號略高，適於中庸肥度之壤土。

二、臺南一號之生育日數與臺中六五號相差不多。第一期較臺中六五號晚一至二天即插秧至收成，需要約一一六天左右。第二期作却較臺中六五號早一至二天，約需九八天左右（林克明）

兎尿本來白色放久會變紅

【問】：一、初生三個月母羊陰部腫脹呈淺紅色有嬰兒拳頭大，是何病症並於三十小時後即告死亡，今後如發現類似情形，應如何治療？

二、羊死在牧地上，離開羊棚約一百碼，處理死羊時應否在停尸處消毒？

三、紐西蘭兎吃了新鮮的構樹葉後即拉痢肚瀉便溺像奶色有時也帶點紅是何緣故？


四、公兎與母兎可否同籠飼養？（臺南縣楠西鄉密枝村雙溪張諸義）

【答】：一、三個月的母羊，其陰部腫脹且紅，可能是公羊强行交配，以致其內部受傷發炎而死，但眞實之原因，要解剖後與生前發生原因對照而判斷，爲了以後發生類似情形，只有加强管理，注意觀察，是否爲公羊交配所致。

二、如果不是傳染病而死的羊，死在羊棚附近是沒有什麽關係，但小心起見，可用石灰粉填蓋。

三、紐西蘭兎可能吃這種葉子太多而發生下痢不過兎尿是白色的，排在外面時間久了，有點變紅。

四、公母兎在三、四個月時可放在一起，但四個月以後就有性慾，可能會早配而影響今後繁殖，最好是分開飼養。（黃立萃）



豐年牌農藥

豐年牌

蔬菜、菸草、果樹病蟲害防治


- 殺蟲淨乳劑
- 富粒松乳劑
- 甲基巴拉松乳劑（最新低毒性）
- 達滅速乳劑（介殼蟲剋星）
- 美達松乳劑（最新系毒性藥劑）
- 保必安乳劑
- 神通靈乳劑
- 滴滴涕水和劑
- 蟲必死水和劑
- 賽文水和劑
- 樂農家水和劑
- 大生M-二二
- 殺也特
- 農家福（植物荷爾蒙）
- 豐年展着劑

興農化工股份有限公司　電話 二六九四六八八

台中縣大里鄉內新路五九号

臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號（臺北縣農會對面）　電話：38826

家禽的救星　禽聖片 A.C.M



專治：鷄、火鷄、鴨、鵝、鴿子、小鳥等傳染性鼻炎、呼吸器病、腸炎、家禽傷寒、球蟲病、傳染性下痢、黴性肺炎、輸卵管炎、消化不良症。

包裝：每小包14片裝，每盒50包裝，500片裝，2000片裝。


（農畜衞可字第0336號）

最佳的獸藥

綜合素 Antimycin

細菌性化膿性諸疾患

濾過性病原體（VIRUS）牛：馬：猪 Influenza 狗 Distemper 家禽 Diphtheria 立克氏（Richettsia）Q熱原蟲性感染症，家禽 Coccidiosis（球蟲病）



用法：筋肉注射用。包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶裝（農畜衞可字第0338號）

太平洋製藥有限公司

說明書備索：臺北市中山北路1段105巷90號　電話：40786