

栽培加工容易的中藥——「玄參」



裕永楊

栽培地必須肥沃，而以空氣流通的疏鬆土壤（砂土）為宜。

玄參的繁殖法，有種子繁殖和無性繁殖二種，但是普通用種子繁殖，在苗床育苗後再行移植，方法和步驟如下：

①選擇苗圃地：以近水和排水良好富有腐植質及砂質壤土之平地或山地為宜。

②整地作畦：消除地上雜草、小樹、石礫等物，施用腐熟堆肥，每平方公尺三公斤，深耕、耙平，使肥料和土壤充分混合，然後作畦。畦寬一公尺，高二十公分，長不定，畦和畦之間隔四十公分，畦面應力求平整以免種子沖失。

「玄參」是應用很廣的一種中藥，根據統計，本省每年約需二萬六千公斤，全部由香港和韓國等地進口，如以市價每公斤一百多元計算，每年即消費達二百多萬元。

臺灣省農業試驗所自民國四十九年十月，由韓國漢城農業試驗場引進「玄參」試種，發現在本省栽培加工容易，所以，農牧局已決定自今年起正式繁殖推廣。

氣候和土質

玄參在本省平地以至高冷地帶（海拔二千公尺）都可以栽培。一般說來它是適於溫暖地帶生長的。

播種：採用撒播法，每平方公尺播二公分，播後用細砂土或燒土，研碎覆蓋。但覆土不可過厚，以免影響發芽；約種子厚度之二倍即可。

④覆蓋：覆土後蓋以稀薄稻草。早晚應各澆水一次，使畦面經常保持適當濕度。一星期後發芽，此時應除去稻草，然後在畦面搭建四十公分高的竹架，除早晚外，應蓋以竹簾。

⑤病蟲害防治：發芽期間容易發生立枯病，所以畦面不宜過量澆水，並用水銀波爾多六百倍液，每十天撒布一次。蟲害以蝸牛最為厲害，宜用手捕捉。

採用無性繁殖時，一般在十月收穫時留下芽頭

你想飼養鰻魚嗎？

農林廳編印的農業要覽第十輯「漁業」，可以告訴你詳細的方法。

除了鰻魚，該書也是養殖虱目魚、草蝦、鱖魚、草魚、烏魚、鯉魚、吳郭魚、牛蛙、牡蠣、蛤、蚶仔等的最好參考資料。現為優待本刊讀者，商請農復會准貼三分之二的成本和掛號郵費，每輯只收十五元，份數不多，售完為止。書款請存郵政劃撥儲金臺灣五九三〇號。

豐年讀者服務部 啓

做種。留下的芽頭可以即時扦插澆水覆土即可。

定植

①栽培地的選擇：平地到海拔一千五百公尺之高地均可。但土層深厚，排水良好，富有有機質之砂質壤土為宜。

②作畦移植：地面上的雜草小樹等可放火燒即作肥料，並用「阿特靈」粉劑作土壤消毒，翻耕，施用腐熟堆肥，耙平作畦。畦寬七十公分，高三十分，畦間隔三十公分每畦種植兩行，株距行距各二十五公分。

管理

①中耕除草：苗長二寸左右時，舉行第一次除草，並去除多餘的芽頭；每一株留一個芽頭。定植後每隔四十至六十日除草一次，並行淺耕培土。

②施肥：定植前應着重基肥之施用，每公頃施堆肥一萬五千公斤。追肥分二次施用：

第一次 肥 硫酸二百公斤（尿素一百公斤）
過磷酸鈣一百公斤
氯化鉀五十公斤
第二次 肥 腐熟油粕一百五十公斤
過磷酸鈣一百公斤
氯化鉀五十公斤

肥料應施在畦中兩行之間，挖寸深之條溝，施後覆土。

③病蟲害防治：夜盜蟲用「安特靈」五百倍液防治。蚜蟲紅蜘蛛等蟲害用「馬拉松」六百倍液防治。

寶冠のタネ



空運來臺

日本原裝

寶冠 夏冠

（ホウカン）
一號、二號
（サンマビ）
（シンク）一號、二號
每包淨重五公克特價卅元郵費在內。一次買十包以上的，每包廿五元

雞交蕃茄種子

日本武藏野種苗園採獲

臺灣農業服務社供應

郵政劃撥帳
號五一九九
戶名康導崑
。臺北市信
義路3段147
巷33街10號