

糊仔玉的肥培管理

生薰林

在本省中南部種植
裏作玉米，可以採用糊
仔栽培法；因為糊仔栽
培既可提高土地的利用
效率，不影響次年第一
期水稻插秧，同時又可
以避免霜害，好處很多
。但是要提提高糊仔玉
米的單位面積產量，除
了採用優良品種，並適
時播種外，還應加倍
注意以後肥培管理的工
作。

施肥

米每公 玉

頃施肥量，除堆肥一萬
二千公升外，尚需硫酸
銨五百五十公斤，過磷
酸鈣三百五十公斤，氮
化鉀一百公斤。堆肥應
於作畦時，先施在水稻
行間，然後用土蓋沒，
使肥分不能流失，並且
到播種玉米前完全腐熟
。硫酸銨的半量，和過
磷酸鈣及氯化鉀全量充
分混合後，一半作基肥
於播種前施入種植溝，
其餘於水稻收穫後立即
施在根傍，然後舉行培
土。剩下的硫酸銨做追
肥，於雄花抽穗前（即
雌花分化期）施在距離
根際二寸遠的地方。注
意肥料不要落在葉上，
以免燒傷葉片。施肥後
行培土，以覆蓋肥料。

間苗中耕

播種時為防止
缺株，每穴宜播二

粒種子。等到苗高十五
至二十公分時行間苗，
每穴留一株強健苗；如
有缺株，應同時移植補
缺。間苗過早時無法淘
汰劣苗，過晚時易於徒
長影響產量，所以必需
適時間苗。

中耕除草和培土工作，
應視實際情形舉行。
發芽後至雄花抽穗前適
時行二至三次，播種後
十五至二十日間苗時同
時行一次除草；但因當
時水稻未收穫，怕切斷
根且工作困難，所以

灌溉

實際情形行灌溉數次。
普通在間苗除草時灌溉
一次，水稻收穫中耕除
草施肥培土後立即再灌
溉一次；以上二次灌溉
水量不需太多。最主要
的灌溉時期，是雄花抽
穗前到成熟時，即雄花
抽穗期及抽穗前後各灌
溉一次，依據玉米灌溉
試驗，以上灌溉可提高
產量四十%左右。玉米
成熟期不要灌溉，反而
必須注意排水。

病蟲防治

栽培糊仔玉米
，須要注意下列病
蟲害：

- (1) 浮塵子：第二期水稻容易發生浮塵子，所以玉米在水稻收穫前後要注意浮塵子的加害。發現有浮塵子發生時，應用10%DDT粉劑，每公頃四十至五十公斤，撒佈於田間畦畔和附近雜草地。蟲害盛發期，應每隔七至十天噴藥一次。
- (2) 玉米螟：秋冬作較春作被害輕微，可於雄花尚未完全抽穗時。撒佈一九·五%「安特靈」五百至六百倍液或10%DDT粉劑或將被害雄花抽出集中一處撒佈藥劑亦可，但是不得帶葉及抽去圃場半數以上之雄花，以免影響授粉。
- (3) 露菌病：目前尚無可靠防治方法。發芽後隨時巡視田間，如果發現病株應隨時拔除深埋土中，不要再移動以免蔓延。

收穫

種植後一百一十至一百二十天即可收穫。如果苞皮強緊，可用剝皮針收穫。收穫後宜充分乾燥，並脫粒貯藏。脫粒可用脫粒機，脫粒後需貯藏時，再曬乾二至三天，使水份降低到十四%以下時方可收藏。殘留莖葉可供飼料或燃料。

蔬菜用藥着注意！

信悟文
興欽圖



臺灣第一美
質四果水
氣味真廉
好燒季真
，落富營
，(和暖部) ! 多養

栽培容易愛
果發(生如)
甲病希(得)
，(和)害噴
，成收好
! 害除藥

藥又質性
種分總萬
類乳攪通
正劑(部)通
坐(和)無使
(多)劑，同
，劑，同