



雞肉養地平泥水

• 湯之屏 •

飼養肉雞，時間短，利潤高。生活愈進步，肉雞的需要量愈大。所以農家飼養肉雞，無論作為專業或副業，都可以在短時期內收回資金，週轉靈活。肉雞以飼養十二個星期就出售比較最為經濟，所以從小雞開始便要十分注意。本篇專談小雞到達前後，應該完成的一切準備工作。

「好的開始，是成功的一半。」請養雞農友們千萬記住這句話。

小雞開始就注意

幼雞必須從優良品種中選出來，並經檢驗，認為健康無病的才可飼養。從孵化場孵出的小雞，必須孵化場證明，已經過白痢檢定無病的才可靠。

不可把來歷不明的小雞、火雞、或其他家禽混

合在肉雞羣中，因為來歷不明的家禽常是攜帶病菌傳播疾病的根源。

肉雞舍在開始時，地面鋪墊物是二吋，務使鋪墊物乾燥，把結塊的鋪墊物取去，並酌量加添新墊物。

開始養新雞時決不可放在已養過一批雞的舊鋪墊物上，以免舊鋪墊物帶有傳染病菌。

一批肉雞養完，就應該把地面鋪墊物全部清除，把雞舍和用具用碳酸水消毒。

防疫，是免除雞病的重大工作，如新城雞瘟、雞痘和呼吸器疾病等，均應事先採取防疫措施。

千萬不要自作聰明，給雞亂吃藥物或打針，應該事前請教獸醫判斷病情，才能對症下藥。

患病和治療過疾病的肉雞，應該殺滅，並應把死雞送離農場，在曠地深埋。千萬不要讓參觀者進入雞舍，避免可能由空氣灰塵而傳播病菌。

靈活運用育雛器

幼雞在第一星期對於溫度的變動最為敏感，過度的熱和冷都能使幼雞食慾衰退增高死亡率。

育雛器分傘狀或直立的兩種，但請農友們勿以為直立育雛器就是巴達利。育雛器應該在幼雞到達前兩天，開始通電發熱。室溫要適當而一定不變。

育雛器第一星期溫度是華氏九十至九十五度。以後每星期逐步遞減至華氏五度。但仍須按外界的氣候情形略加調整。

幼雞擁擠在一起，表示育雛器的溫度不夠，相反的，幼雞分散在傘狀育雛器的四圍矮籬，或在直立育雛器的外圍，這是表示溫度太高，應該立即調整。

用燃瓦斯育雛器，不需要強光。用電熱傘狀育雛器，十五支光的燈泡已足夠引誘幼雞到熱源附近。

，每天有十四小時的光照，就足夠幼雞取食生長。秋冬季節，日短夜長，光照時間應該延長，以便幼雞充分取食，在非常熱的時候，或早晨和晚上必須用光照，補助幼雞取食，這樣可以保持雞生長的正常化。

在育雛室內有四十支光的燈泡，可供四百平方呎平地以內所需足夠的光亮。

傘狀育雛器的邊緣要離地約二吋，以便電熱烘乾鋪墊物，同時趁機檢查育雛器的性能是否良好。

雞舍要有好管理

按照美國的資料，三萬隻肉雞，只須一人管理，但是臺灣的情形不同，仍須依靠雞舍的式樣，有無自動飼料供應設備，市場運銷方式，額外和臨時清潔打掃工人的雇用等因素而決定。

肉雞舍要能無休閒的利用最為經濟，設法有計劃的經營，使四、五個育雛器能够一年到頭不停的工作，最為合算。

通風，對於室溫的保持並沒有損害，適當的通風，可以排除糞便蒸發的惡臭，也可以使糞便保持乾燥。

由空氣傳染的病菌，較易發生在通風不良的雞舍中，尤其是慢性呼吸器病(CRD)，更易發生。假使實在通風不良，應用排氣的風扇協助，但千萬不可對雞羣直接送風。

老鼠、蒼蠅、蟲、野鳥和疫病，都是飼養管理的阻碍，傳上了疫病會浪費飼料，所以每月都必須澈底的消除一次。

安裝設備有距離

在平地同樣的養一隻肉雞：如果祇有半平方呎的空間，僅適於飼養到六個星期，○.八平方呎的話，可飼養到九至十個星期，擴大到一平方呎的空間便可飼養到十一至十二個星期。

可容一千只小雞的傘狀育雛器，以容七百五十只小雞為適度，以免過於擁擠影響健康。可容五百只小雞的傘狀育雛器以容四百只小雞為適度。

從第一個星期到十天，一個飼料槽可供一百只小雞之用，每只小雞中間在就食時的距離，要能保持一時。自第二星期到出賣為止，如採用長管型飼料槽的每只小雞約需三十個，如果是桶型飼料槽的話，每只小雞約需二十五個。

從育雛第一天至兩星期，二個一加侖的飲水器可供一百只小雞之用。
從第三星期到出賣為止，二十個三加侖的飲水器可供一千只小雞飲用。

！炎腦本日的豬

清法趙

飼養種母猪的農友們，如遇到母猪流產或死胎時，必須特別注意，因為患有日本腦炎的種母猪，就是常常發生這樣的病狀。

懷孕豬機會多

本病又名流行性腦炎，病因和人類等其他動物所發生的日本腦炎相同，是一種日本腦炎病毒。一般都由蚊蟲的媒介而感染，當蚊蟲吸血時常呈不顯性感染。

每年九至十月間發生最多。

患日本腦炎的豬隻，以懷孕豬較多，尤其是初產豬最多。各地常會分散的發生，但有時在某一區養豬的集中地，全部懷孕豬都會受感染。

懷孕母猪到達預定的分娩期時，腹部不見膨大下垂，乳房也沒有變化。分娩時能產正常的仔豬很少，有時多產全部黑褐色的仔豬，發育程度大小不一，同時有附着胎膜排出來。且多引起流

計算飼料要經濟

對於幼雛的飼料消費和體重都必需保持完全而正確的記錄。因為飼養肉雞能否成功，需要依靠完整的記錄，才能估計出來。

當肉雞對於飼料消耗量減退，這是將要發生雞病的第一次訊號，應該趕快檢討管理飼料等方面的問題，是否犯有錯誤？

左表是推算每一千只肉雞，在十二個星期中，每週所需消費飼料的磅數，一共是一萬二千九百五十磅，折合五千八百八十六公升。

雞齡	磅數	雞齡	磅數
第一週	二〇〇	第七週	一、二五〇

產或難產。

正當生產母猪患病時，都發熱，食慾不振，所產的仔豬，常發生旋回運動和食慾減退等。

滅蚊蟲

防腦炎

本病還沒有特殊的治療法，患病的母猪要注意使它迅速恢復疲勞。引起流產時，應在流產後的幾天以內，把生殖器官消毒，用消毒藥液加百分之二來蘇兒液洗滌。如引起難產時，可注射催生針，如腦下垂體後葉素(Pituitary)促進陣痛，排出胎兒。倘胎兒排出仍有困難時，應請當地獸醫動手術，把胎兒排出後，再用百分之二來蘇兒液消毒外陰部。

如果能依照下列幾種方法施行預防效果是極大的。

(1)儘量防止發生蚊蟲，排水溝須經常清潔，同時可投入如火油等油劑，防止繁殖蚊蟲。

(2)由於蚊蟲常吸豬體的血而感染本病，可在豬舍散佈殺蟲劑，如DDT、BHC等，同時門窗最好設置紗網。

(3)如能買到日本腦炎預防液，最好在五至六月間實施預防注射。

第二週	四〇〇	第八週	一、四〇〇
第三週	五〇〇	第九週	一、四五〇
第四週	六五〇	第十週	一、六〇〇
第五週	八五〇	第十一週	一、七〇〇
第六週	一、一〇〇	第十二週	一、八五〇

準備妥當迎小雞

飼養小雞以前的兩星期要提前做好一切準備工作：先把飲水器，飼料槽和其他可移動的東西搬出雞舍，用水洗刷乾淨，再用消毒藥水和稀釋石灰酸水消毒。育雛器也要用水洗刷乾淨，不留絲毫殘積糞物。

其次是打掃雞舍，如有雞糞殘留在壁上和角落的須用小刀刮去，然後清掃平地，清除全部天花板灰塵，用消毒藥水噴全雞舍，包括牆壁，天花板，平地。等待三天，雞舍內已充分乾燥後，再用新的鋪墊物鋪在地面。

另外，拔去沿雞舍四週的野草，以免蚊蟲和鼠類躲入為害。

食槽沿着傘狀育雛器四周等距離按放，在每個食槽和食槽之間放置飲水器。

裝運幼雛紙盒的蓋，在幼雛孵出時可代用幾天，每個紙盒約可供一百隻幼雛在內取食。

把飲水器在小雞運達之前廿四小時充滿，使水溫逐漸增高而接近室內溫度。

離傘狀育雛器二呎的四圍，先用十八吋高的紙板做矮圍牆，使雛雞可以不致遠離熱源而受凍。

準備起初三個星期的小雞飼料，蛋白質含量以百分之廿二為宜。

當小雞運到雞場，應該仔細每隻觀察，但不可把小雞從紙盒裏傾倒出來，而是要均勻的把小雞輕放在育雛器下，特別把體弱、傷殘和不够健康標準的小雞淘汰殺滅，把記錄卡片掛在雞舍內，以便逐日仔細記錄。

以上這些，都是小雞到達前後，應該做的工作，請農友們記住：好的開始，是成功的一半。