

可容一千只小雞的傘狀育雛器，以容七百五十只小雞為適度，以免過於擁擠影響健康。可容五百只小雞的傘狀育雛器以容四百只小雞為適度。

從第一個星期到十天，一個飼料槽可供一百只小雞之用，每只小雞中間在就食時的距離，要能保持一時。自第二星期到出賣為止，如採用長管型飼料槽的每只小雞約需三十個，如果是桶型飼料槽的話，每只小雞約需二十五個。

從育雛第一天至兩星期，二個一加侖的飲水器可供一百只小雞之用。
從第三星期到出賣為止，二十個三加侖的飲水器可供一千只小雞飲用。

！炎腦本日的豬

清法趙

飼養種母猪的農友們，如遇到母猪流產或死胎時，必須特別注意，因為患有日本腦炎的種母猪，就是常常發生這樣的病狀。

懷孕豬機會多

本病又名流行性腦炎，病因和人類等其他動物所發生的日本腦炎相同，是一種日本腦炎病毒。一般都由蚊蟲的媒介而感染，當蚊蟲吸血時常呈不顯性感染。

每年九至十月間發生最多。

患日本腦炎的豬隻，以懷孕豬較多，尤其是初產豬最多。各地常會分散的發生，但有時在某一區養豬的集中地，全部懷孕豬都會受感染。

懷孕母猪到達預定的分娩期時，腹部不見膨大下垂，乳房也沒有變化。分娩時能產正常的仔豬很少，有時多產全部黑褐色的仔豬，發育程度大小不一，同時有附着胎膜排出來。且多引起流

計算飼料要經濟

對於幼雛的飼料消費和體重都必需保持完全而正確的記錄。因為飼養肉雞能否成功，需要依靠完整的記錄，才能估計出來。

當肉雞對於飼料消耗量減退，這是將要發生雞病的第一次訊號，應該趕快檢討管理飼料等方面的問題，是否犯有錯誤？

左表是推算每一千只肉雞，在十二個星期中，每週所需消費飼料的磅數，一共是一萬二千九百五十磅，折合五千八百八十六公升。

雞齡	磅數	雞齡	磅數
第一週	二〇〇	第七週	一、二五〇

產或難產。

正當生產母猪患病時，都發熱，食慾不振，所產的仔豬，常發生旋回運動和食慾減退等。

滅蚊蟲

防腦炎

本病還沒有特殊的治療法，患病的母猪要注意使它迅速恢復疲勞。引起流產時，應在流產後的幾天以內，把生殖器官消毒，用消毒藥液加百分之二來蘇兒液洗滌。如引起難產時，可注射催生針，如腦下垂體後葉素(Pituitary)促進陣痛，排出胎兒。倘胎兒排出仍有困難時，應請當地獸醫動手術，把胎兒排出後，再用百分之二來蘇兒液消毒外陰部。

如果能依照下列幾種方法施行預防效果是極大的。

(1)儘量防止發生蚊蟲，排水溝須經常清潔，同時可投入如火油等油劑，防止繁殖蚊蟲。

(2)由於蚊蟲常吸豬體的血而感染本病，可在豬舍散佈殺蟲劑，如DDT、BHC等，同時門窗最好設置紗網。

(3)如能買到日本腦炎預防液，最好在五至六月間實施預防注射。

第二週	四〇〇	第八週	一、四〇〇
第三週	五〇〇	第九週	一、四五〇
第四週	六五〇	第十週	一、六〇〇
第五週	八五〇	第十一週	一、七〇〇
第六週	一、一〇〇	第十二週	一、八五〇

準備妥當迎小雞

飼養小雞以前的兩星期要提前做好一切準備工作：先把飲水器，飼料槽和其他可移動的東西搬出雞舍，用水洗刷乾淨，再用消毒藥水和稀釋石灰酸水消毒。育雛器也要用水洗刷乾淨，不留絲毫殘積糞物。

其次是打掃雞舍，如有雞糞殘留在壁上和角落的須用小刀刮去，然後清掃平地，清除全部天花板灰塵，用消毒藥水噴全雞舍，包括牆壁，天花板，平地。等待三天，雞舍內已充分乾燥後，再用新的鋪墊物鋪在地面。

另外，拔去沿雞舍四週的野草，以免蚊蟲和鼠類躲入為害。

食槽沿着傘狀育雛器四周等距離按放，在每個食槽和食槽之間放置飲水器。

裝運幼雛紙盒的蓋，在幼雛孵出時可代用幾天，每個紙盒約可供一百隻幼雛在內取食。

把飲水器在小雞運達之前廿四小時充滿，使水溫逐漸增高而接近室內溫度。

離傘狀育雛器二呎的四圍，先用十八吋高的紙板做矮圍牆，使雛雞可以不致遠離熱源而受凍。

準備起初三個星期的小雞飼料，蛋白質含量以百分之廿二為宜。

當小雞運到雞場，應該仔細每隻觀察，但不可把小雞從紙盒裏傾倒出來，而是要均勻的把小雞輕放在育雛器下，特別把體弱、傷殘和不够健康標準的小雞淘汰殺滅，把記錄卡片掛在雞舍內，以便逐日仔細記錄。

以上這些，都是小雞到達前後，應該做的工作，請農友們記住：好的開始，是成功的一半。