

氫溴酸配檳榔素治狗條蟲極有效

【問】：一、仔豬排大豆樣便，係為何種病因？如何預防？如何治療？

二、狗患條蟲病以何種藥物驅蟲最為有效及副作用少？

三、狗患大瘧熱後角膜充血混濁以何種藥物治療較為有效？（臺中縣東勢鎮東關街田印壽）

【答】：一、仔豬排大豆樣狀糞便，可能是消化不良，此仔豬如在哺乳期中，要注意母豬的飼料及健康情形，因母豬的健康情形常可間接影響哺乳中的仔豬。此仔豬如開始眼給飼料，則要給易消化之飼料，並給少許鮮嫩青飼料。

二、狗條蟲的藥種類很多，普通用氫溴酸檳榔素，效率近一百%，此外有用Vermox，為一種較新的藥，除條蟲外對其他狗蛔蟲等亦有效，但效率只有八十%左右，市上有售。

三、大瘧熱病要預防併發症，一面注射犬瘧熱血清，一方面注射配尼西林，此外並注意護理工作，如給易消化的流質食物，預防便秘等。（李登元）

文旦種植距離需三十至四十尺

【問】：一、我所種的文旦已有六、七年，大約有一丈多高，每株距離十二尺，現在枝是很茂盛，是不是可以剪去。

二、請問荔枝，種落的期間約有三年，現時發見，荔枝母頭（幹基）部週圍，忽然間起灰，二三天後乾枯而死，未知應該使用何藥來防治？（彰化二林東華里路中巷二五號張炎山）

【答】：一、文旦的種植距離需要三十至四十尺，你種植的距離祇有十二尺，自然不適當。現在如感覺太密，應趕快每隔一株掘去一株，這樣可以維持廿四尺的距離，新結果影響較小。如果將過密的枝條剪去，對的枝葉還會產生，並不能解決你的問題。不過為了減少你的損失，你可在明年一至二月

（新曆）間，將必需掘起的植株的枝葉剪除，然後小心將根掘起（最好能附土團），移植他處，如管理適當，仍可成產。

二、荔枝的枝幹如受一種叫木蠹蛾的幼蟲為害，可使枝幹忽然枯死。凡枯死之枝幹，可在枯死的下部發見一圓形蟲孔，與木質部的空洞相連。要防治這種蟲害，可在荔枝的枝幹部每兩個月塗敷五十—一百倍的地特靈乳劑一次，非常有效。（張振宙）

香蕉留芽偽莖

果手果指是什麼意思



【問】：一、香蕉「留芽」是何意？
二、「偽莖」是何意？
三、「果指」、「果手」兩詞是那一部分？

四、一公頃合幾畝甲？

五、每株香蕉自種植至收穫應施多少氮、磷、鉀（臺斤折算）（雲林斗六三平里園南路五號林桐元）

【答】：一、留芽——即留萌或留苗的意思，香蕉頭發生很多芽苗。通常香蕉都是留一大株一小株，大株收穫，小株長大，多餘的芽苗除掉。留芽即指一大株旁留一個吸芽將來長成大株。

二、偽莖——把香蕉的葉一片一片割下來，似竹筍狀，那是真莖。通常露在外面粗大的莖稱香蕉偽莖。

三、果手係一把一把或一段一段香蕉果實的總稱，果指就是指單根香蕉而言。

四、每公頃合一〇三甲。

五、香蕉施肥每株每年以氮磷鉀三要素比率為一比一比三，以肥料量折合硫酸八百公分（一〇三臺斤）過磷酸鈣八百八十公分（一〇六臺斤）氯化鉀八百公分（一〇三臺斤）種植前每株穴內施堆肥十至十五公斤（十四至二十五臺斤）。（王兆全）

德國製

Bismarck 俾斯麥

鋼筆 不銹鋼

禮用·辦公·自用·均宜

最新150型

特價 NT.\$88.-

新發售

總代理 義森貿易行 49808-49809 TEL.

豐年牌農藥

牌年豐

蔬菜、菸草、果樹病蟲害防治

- 殺蟲淨乳劑
- 富粒松乳劑
- 甲基巴拉松乳劑（最新低毒性）
- 達滅速乳劑（介殺滅剋星）
- 美達松乳劑
- （最新系毒性藥劑）
- 保必安乳劑
- 神通靈乳劑
- 滴滴涕水和劑
- 蟲必死水和劑
- 木發文水和劑
- 樂農家水和劑
- 大生M122
- 殺也特
- 農家福
- （植物荷爾蒙）
- 豐年展着劑

興農化工股份有限公司 電話 二六一九 四六八八

台中縣大里鄉內新路五九號

臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號（臺北縣農會對面） 電話：33826