

農友經驗

看天田宜種耐旱的高粱

本省西部看天田，適合種植臺中一號高粱，經驗上比玉米好。

我是今年四月五日，承臺中區農業改良場贈送試種的，次日就播種，每隔五十分做一條淺溝，混合適量的三要素，條播，因土地貧瘠，株距定為二十一至二十四公分。

在幼苗二十公分時，行第一次間拔，除草和施人追肥。苗高四十公分分就培土，並嚴格間拔。

隨時注意防治蟲害，培土後和播種後六十天，噴射一千五百倍巴拉松，播種後約九十天，就是齊穗時，噴射賽文五百倍最為有效。

我試驗一厘地看天田，種植後，適逢久旱，但生長仍很良好，足證它是可以耐旱的。七月十五日開始收穫，產量一百零六斤，桿高一百七十公分，疏一點的就沒有這樣高了，優良的一穗有四至六臺兩這麼重，比當地高脚種產量可增產二至三倍。（苗栗縣三灣鄉大坪村六十六號李宇）

香蕉結果後如何照顧？

香蕉結果初期，要誘導花苞下垂；使它不要靠在支柱旁邊，以免擦傷。至於果實究竟留幾段為宜？那要看香蕉的發育情形而定，好的可留八、九段，差的可留四、五段。凡是頭段的，大都因果指數過少，應該視為畸形，用小的尖端把它割除，但不要使隣近果指受傷，以免果軸腐爛。結果中期，果房如斜生，可用香

蕉纖維繫在果房末端，牽拉在植株上，使它和地面垂直，位置適當，果實便不會擦傷，顏色也會好。檢視各果段生長不整齊時，可在晴天的上午十點至下午三點之間，因為溫度較高，果柄受熱會變軟，容易矯正果指位置。

結果後期，就是摘心後二十天（夏蕉），開始病蟲害防治，（春冬秋蕉時間各不同）用大生粉劑七八，混合馬拉松四百倍噴射果房全面。噴藥後三、四天，用清潔的水泥袋套住果房，預防病蟲害，套袋時防止果實擦傷。（彰化縣社頭鄉朝興村山脚路九十六號蕭昌欽）

使用噴霧器怎樣省力氣

農友們在田間噴射農藥，如果用的是半自動式四個噴嘴的噴霧器，可能很吃力。因為四個噴嘴的桿子較長，也比較重，如果長時間的用手提著操作，手會感到酸痛。我想出一個方法，非常簡單有效。



我的方法是用一枝小竹桿，把它粗的一端綁在噴霧器上，把細的一端接一條細繩，把細繩的先端吊起來操作。噴酒農藥很方便。（南投縣草屯鎮北勢里玉屏路四十一號陳照德）

原裝農藥



日本農藥株式會社榮譽出品

蔬菜，洋菇，茶，柑桔害蟲防治特效藥
藥効速，殘毒少，收穫前一星期前也可使用

農藥登記證第 274 號

日農 DDVP 乳劑

（滴滴微皮乳劑）

防治範圍：洋菇：治毒菇床，防治跳蟲，菇蠅。
蔬菜：青蟲，蚜蟲，蕪菁葉蜂，粉蛾，夜盜蟲，大二十八星瓢蟲。
茶：金紋細蛾，捲葉蛾幼蟲，紅蜘蛛。
柑桔：吹綿介殼蟲，蚜蟲，桃：桃粉野，浮塵子，花編蟲。
桑：尺蠖，繭馬，胡麻燈蛾，小葉蟲，木蟲，金毛蟲。

原裝農藥



日本農藥株式會社有名製品

農藥登記證第 426 號

日農特製砒酸鉛

防治範圍：水稻：青蟲，稻苞蟲，蝗蟲。
玉米：玉米夜盜蟲。
大豆：姬金龜。
黃麻：夜盜蟲。
蔬菜：夜盜蟲，青蟲，蕪菁葉蜂，菜象鼻蟲，蕪菁葉蜂。
落薯：葉毛蟲。
柿：蛀蒂蟲。

日農殺爾頓 75

（サルトン 75）

防治：西瓜，豆類，菸葉，蔬菜；白粉病。柑桔：銹病，象皮病。茶：紅蜘蛛。小麥：銹病。

日農地特靈乳劑

防治：柑桔、木麻黃：星天牛及防治天牛產卵。
松樹：綠葉蜂，毛蟲。
香蕉：象鼻蟲。
其他數十種範圍廣潤不及備載

日農阿特靈乳劑

防治：鳳梨、香蕉：防蟻。甘藷：象鼻蟲。甘蔗：蔗龜，金針蟲。蘿蔔、紅蘿蔔、馬鈴薯、甜菜、葱、薑等菜園：地下蟻，螞蟥，（鷄母蟲）等，其他一切地下土塊害蟲。

日農汎水銀波爾多

（バン水銀ボルドー）

防治：柑桔：黑點病，瘡痂病，潰瘍病。瓜類：露菌病，炭疽病。蕃茄：疫病，輪紋病，葉霉病。馬鈴薯：疫病，夏疫病。

日農水銀波爾多

防治：防治各種作物的病害，殺菌力特強，經濟實惠的農藥。

進口現貨供應 泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路2段108號 電話：44994號

製造廠

日本農藥株式會社

東京・大阪