



蝸牛可捕殺也可用藥撲殺

【問】：一、在靠近甘蔗園種植的秋作旱田花生，有蝸牛為害(吃盡嫩葉及啃傷莖皮)，除了捕捉以外，有何其他方法或藥劑，可資防治？

二、除了蝸牛之外，還有一種黑色無殼的蝸牛體爬蟲(蛞蝓)，可否比照前述方法防治？(嘉義縣竹崎鄉獅寮村宋瑞光)

【答】：防治蝸牛及蛞蝓除用徒手捕殺外尚可用下法驅除：①出園四周清除雜草石塊使蝸牛等無藏匿地方。②施用蝸牛蛞蝓誘殺毒餌「蝸立死」一粒劑誘殺。③天晴無雨時可用噴氮化鈣(烏肥)或煙絲煙粉等撒布田園四周，可防止其侵入並毒死之(但遇下雨無效)。(張良傳)

甘蔗行距株距適中結球就大

【問】：坂田黑葉理想甘藍，用多少株距，可以生產二公斤重的菜球；又定植後多少天可以收穫？(彰化縣社頭鄉邱傳湖)

【答】：坂田黑葉理想甘藍，係屬中小形品種，行距六十至六十五公分，株距四十二公分，可以生產平均二公斤重的菜球。又本品種為中熟種，定植後六十五天可以開始收穫。(郁宗雄)

急想種豌豆請火速解答難題

【問】：本人閱第十四卷十九期豐年第十七頁「今年冬季製作那種作物有利」一欄，覺得英豌豆栽培較為理想，即刻研究栽培，但是一不知何處買種子？二、如何栽培？三、如何出售等？(中埔隆興村十字路十三)

號程慶豐

【答】：一、軟莢豌豆之種子全省各地之種子商均有出售，但臺中九號宜向和美鎮農會洽購。

二、軟莢豌豆之栽培及其他事項，請參照本刊第十四卷二十期辦理。

三、軟莢豌豆採收豆莢出售為主，加工豌豆採收豆仁出售或加工為主，在植物分類上亦有差別，一般加工豌豆分枝少，耐寒力差，種子為黃色或綠色呈皺紋。(王進生)

鷄種隨便雜交後果不佳

【問】：一、我所養之肉雞為洛島紅、蘆花雞紐漢西三種所交配的，至今已二個多月了，可是很矮小而雞冠大，這是何病？如何補救？

二、羽毛為何不光滑。

三、雞蛔蟲藥什麼最好？

四、母的幾個月可下蛋？

五、雞舍以什麼形式最好！(為嘉義光彩街三三一號莊德敏)

【答】：一、此種肉用雞如加沒有發現其他病徵，可能不患病，而是三種雞雜交結果所得到的後代，由於遺傳的關係，致體格長不大，而雞冠又長得大，此種雞宜及早出售或淘汰，更不宜再作種用。

二、雞的羽毛不光滑，可能因為雞的營養不好，或由於雞患寄生病，球蟲病等的結果。

三、雞蛔蟲的藥種類很多，此處可介紹幾種，給你作參考「P.N」片及「畢彼拉淨」對雞蛔蟲的效率都很好。

四、普通卵用種雞約在五至六月間，兼用種雞約在六至七個月間，並與飼養情形有關。

五、普通採用單斜面的

屋頂，每個雞舍容納種雞數十隻，如屬大規模養雞，則各雞舍應成羣落式的安置。(李登元)



豐年牌農藥



蔬菜、菸草、果樹病蟲害防治

- 殺蟲淨乳劑
- 富粒松乳劑
- 甲基巴拉松乳劑 (最新低毒性)
- 達滅速乳劑 (介殺蟲剋星)
- 美達松乳劑 (最新系毒性藥劑)
- 保必安乳劑
- 神通靈乳劑
- 滴滴涕水和劑
- 蟲必死水和劑
- 木賽文水和劑
- 樂農家水和劑
- 大生M-1-2-3 殺也時
- 農家福 (植物荷爾蒙)
- 豐年展着劑

興農化工股份有限公司


電話 二六一九 四六八八

台中縣大里鄉內新路五九号

臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號

(臺北縣農會對面) 電話：38826

禽聖片 A.C.M 家禽的救星



專治：雞、火雞、鴨、鵝、鴿子、小鳥等傳染性炎、鼻炎、呼吸器病、腸炎、家禽傷寒、球蟲病、傳染性下痢、慢性肺炎、輸卵管炎、消化不良症。

包裝：每小包14片裝，每盒50包裝，500片裝，2000片裝。

(農畜衛可字第0336號)

最佳的獸藥

綜合素 Antimycin

細菌性化膿性諸疾患

濾過性病原體 (Virus) 牛：馬：豬 Influenza 狗 Distemper 家禽 Diphtheria 立克氏 (Rickettsia) Q熱原蟲性感染症，家禽 Coccidiosis (球蟲病)

用法：筋肉注射用。包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶裝(農畜衛可字第0338號)



太平洋製藥有限公司

說明書備索：臺北市中山北路1段105巷90號 電話：40786