

介紹臺北宜蘭的優良稻種

謝賢文

臺中六五號

本品種於民國十二年第二期雜交(龜治×神力)，民國十八年選出，臺北地區栽培面積，五十二年第一期作為一萬零一百一十六公頃，第二期作為一萬一千七百七十八公頃。平年產量，一期作四千五百三十七公頃，二期作三千九百七十七公頃。

本品種的倒伏性耐肥性、抗蟲性、抗風性、抗旱性和脫粒性等都是中等，但是抗病性很弱。生育日數一期作一百二十一日，二期作九十七日。在臺北區各地都可以栽培。

播種適期：一期作一月下旬，二期作七月中旬。
插秧適期：一期作三月上、中旬，二期作七月中、下旬。

施肥量(公斤/每公頃)：一期作

氮肥	三二〇	二期作	三〇〇
磷肥	二〇〇	二期作	一八〇
鉀肥	一一〇	二期作	一〇〇

栽培上應特別注意事項：本品種對稻熱病抵抗力很弱，在栽培上應特別注意稻熱病的防治，並注意肥料三要素的配合，不要施用過多的氮肥。

臺北一七七號

本品種於民國二十五年第二期雜交(黃尖×旭)，民國三十年選出。平年產量：一期作四千五百六十五公頃，二期作三千二百一十六公頃。第一期作或第二期作都很適合。

本品種耐肥性較弱，容易倒伏，抗病蟲性和抗旱性也弱，但是分蘗力強，比較早熟，米質上等。生育日數：一期作一百一十七日，二期作九十七日。

本品種最適合在砂質壤土水田栽培，北投、士林、八里、三芝、石門、汐止和七星等地都很適宜。

播種適期：一期作一月下旬，二期作七月上、中旬。
插秧適期：一期作三月上、中旬，三期作七月中、下旬。

施肥量(公斤/每公頃)：一期作

氮肥	二九〇	二期作	二六〇
磷肥	一八〇	二期作	一八〇
鉀肥	一一〇	二期作	一〇〇

栽培上應特別注意事項：本品種耐肥性較「臺中六五號」弱，不適於肥沃地區栽培，並需注意施肥量，不要施用過多的氮素肥料，同時要注意胡麻葉枯病的防治。

臺北三〇一號

本品種父母本為「臺中六五號」和「菁稿岸」，於民國二十五年第二期雜交，民國三十年第一期作選出。

平年產量：一期作四千三百七十二公頃，二期作三千零四公頃。第一期或二期作都可以栽培。

本品種抗風、抗旱、脫粒等都是中等，稍易倒伏，抗病蟲害性稍強。生育日數：一期作一百一十八日，二期作九十八日。栽培地以壤土和砂質壤土水田最為適宜；新莊、泰山、五股、林口、三重等地區都適合栽培。

播種適期：一期作一月下旬，二期作七月上、中旬。
插秧適期：一期作三月上、中旬，二期作七月中、下旬。

施肥量(公斤/每公頃)：一期作

氮肥	三〇〇	二期作	三〇〇
磷肥	一九〇	二期作	一八〇
鉀肥	一一〇	二期作	一〇〇

栽培上應特別注意事項：本品種較能耐肥，施肥量可酌量增加。

臺北三〇六號

本品種為「臺北五號」和「臺北六號」的雜交種，於民國四十五年選出。

平年產量：一期作四千五百七十二公頃，二期作三千三百五十八公頃。本品種稍易倒伏，不耐肥，抗病蟲害性弱，不抗風，抗旱性稍強，適合臺北和宜蘭缺水地區栽培。脫粒性中等。生長日數：一期作一百二十日，二期作九十八日。

播種適期：一期作一月下旬，二期作七月上、中旬。
插秧適期：一期作三月上、中旬，二期作七月中、下旬。

栽培上應特別注意事項：本品種稍稱稍細，抗風力較弱，容易倒伏，不適合強風地區和排水不良的地區栽培。對於施肥量需要特別小心，應三要素並用，同時要注意稻熱病的預防。

施肥量(公斤/每公頃)：一期作

氮肥	三〇〇	二期作	三〇〇
磷肥	一九〇	二期作	一八〇
鉀肥	一一〇	二期作	一〇〇

臺北三〇七號

本品種為「黃尖」和「旭」的雜交種，於民國四十五年選出。平年產量：一期作四千六百二十八公頃，二期作三千三百八十五公頃。

本品種稍難倒伏，很耐肥、抗風、抗病蟲、脫粒稍難，適合宜蘭區、臺北縣、新莊、海山和三芝肥沃地區栽培，抗旱性稍弱。生長日數：一期作一百二十二日，二期作一百日。

播種適期：一期作一月下旬，二期作七月上、中旬。
插秧適期：一期作三月上、中旬，二期作七月中、下旬。

施肥量(公斤/每公頃)：氮肥：一期作三〇

○公斤，二期作三〇〇公斤。磷肥：一期作一九〇公斤，二期作一八〇公斤。鉀肥：一期作一二〇公斤，二期作一〇〇公斤。

臺北三〇八號

本品種父母也是「黃尖」和「旭」，於民國三十九年一期雜交，民國四十七年一期選出。平年產量二期作四千六百五十六公斤，二期作三千六百八十三公斤。

本品種為抗病強，早熟，抗風又豐產的優良品種，稻稈強，米質好，中等耐肥。生育日數：一期作九十天，二期作七十七天。

本品種除適應砂質壤土、壤土和黏質壤土栽培外，在土層深厚的地區更有優異的表現，尤其以季節風強的海岸地帶最為理想。淡水、三芝、金山和萬里都可以栽培。

播種適期：臺北地區一期作一月中旬至下旬，二期作七月上旬至中旬；宜蘭地區一期作一月上旬至一月中旬，二期作六月下旬至七月上旬。

施肥量(公斤/每公頃)：

氮肥	一期作 二八〇	二期作 二五〇
磷肥	一期作 一九〇	二期作 一八〇
鉀肥	一期作 一一〇	二期作 一〇〇

栽培上應特別注意事項：本品種在幼穗形成期後，因對氣溫逐漸敏感，所以應特別注意保持適當水溫。如果未遇到氣溫突變時，保持淺水即可；但是遇到低溫時，應即灌溉深水，以提高水溫。

臺南三號

本品種是「光復四〇一號」雜交「準八三號」(光復號雜亦嘉南一四號)的後代，民國四十四年第二期選出。平年產量：一期作四千五百一十三公斤，二期作三千八百七十五公斤。植株稍不易倒伏，耐肥性抗病蟲性抗旱性等都是中等；脫粒較難，對葉稻熱病和穗頸稻熱病都是中抗至中感。生長日數：一期作一百二十一日，二期作九十五日。適合宜蘭地區。

播種適期：一期作十二月下旬至一月上旬，二期作六月下旬至七月上旬。

播種適期：一期作二月中、下旬。二期作七月上、中旬。

施肥量(公斤/每公頃)：

氮肥	一期作 三〇〇	二期作 二四〇
磷肥	一期作 四〇〇	二期作 三五〇
鉀肥	一期作 一三〇	二期作 一五〇

豐盛種子行 啟事

本行經營蔬菜種子蒙受各位先生愛顧業務日進擴張，為配合業務之進展，經已十一月廿六日遷於

嘉義市中正路五九五號(富山旅社隔壁)
並增設電話四二〇八號

繼續為各位農友先生服務，祈請照過去加予愛顧，並請光臨指導為禱。

豐盛種子行

各種蔬菜種
籽價目表函
索即奉寄

嘉義市中正路五九五號
電話：四二〇八號
劃撥儲蓄金嘉字八〇九六〇號

農林廳登記檢驗合格的農藥

本省農藥廠商向農林廳辦理登記的農藥，經檢驗合格後發給證書，下面是農林廳五至八月份新發、補發、更換登記的農藥名單，可供農友們選購的參考。

農藥名稱	主要成份	出品廠商	申請登記農藥商	登記號碼
廣原皮益母乳	Parathion + Malathion	日本イハラ農藥株式會社	靜興企業有限公司	一〇一
廣原馬拉松乳	Malathion	全右	全右	一〇二
廣原殺爾偉特	Sulphate	全右	全右	一〇三
廣原46.6%巴拉松乳劑	Parathion	全右	全右	一一八
廣原安特靈乳劑	Endrin	全右	全右	一七九
廣原阿蘇仁	Asozin	全右	全右	二三八
Polyram Cambi 80% W.P. 保利農	Metram	Badische Anilin & Soda Fabrik A.G. West Germany	永松貿易股份有限公司	三六一
抗病				
美農乳劑	Pam Organic Mercury	亞細亞化學股份有限公司	全上	三六二
稻熱靈乳劑	Pam Organic MZrcury	五豐化學工業股份有限公司	全上	三六三
立農水銀乳劑	Pam Organic Mercury	立農化學工業股份有限公司	全上	三六四
Dieldrin 18.25% E.C. 地特靈乳劑	Dieldrin	Nordisk Alkali Biokemi Ltd. Denmark	永興貿易行	三六五
W.P. 地特靈	Dieldrin 50%	Nordisk Alkali Biokemi Ltd. Denmark	全右	三六六
可濕性粉				
安特靈乳劑	Endrin	允發農化工廠有限公司	全上	三六七
殺蟲粉1.5% 靈丹粉劑	B.H.C.	新裕化工廠	全上	三六八
靈丹粉劑	B.H.C.	興農化工股份有限公司	全上	三六九
富力松乳劑	Parathion	第一農藥化學工業股份有限公司	全上	三七〇

(下接十六頁)