

栽培洋菇蕃茄業者請注意

鐵的證明

蕃茄發生疫病，炭疽病，葉黴病
洋菇發生褐斑病（斑點病）

請使用

大生精 液劑

ダセニステンス



提高產量，改良品質

防治蕃茄晚疫病，請參看本期34頁「裏作蕃茄，注意晚疫病！」專稿報導



敬啟者，敝公司所經銷之大生精，自上市以來，深受各界人士之歡迎，並蒙各農作物種植者之熱烈支持，特此鳴謝。茲將大生精之優點，分述如下：

- 一、以三、五倍濃度噴灑於蔬菜、果樹、花卉等，無發生藥害。
- 二、無使用大生精之殘留，殘留之藥效，經實驗證明，大生精之三、五倍濃度，即可完全防治，且無不藥。
- 三、以三、五倍濃度噴灑於果樹，可防止果實之落果。
- 四、以三、五倍濃度噴灑於果樹，可防止果實之落果。
- 五、以三、五倍濃度噴灑於果樹，可防止果實之落果。
- 六、以三、五倍濃度噴灑於果樹，可防止果實之落果。
- 七、以三、五倍濃度噴灑於果樹，可防止果實之落果。
- 八、以三、五倍濃度噴灑於果樹，可防止果實之落果。
- 九、以三、五倍濃度噴灑於果樹，可防止果實之落果。
- 十、以三、五倍濃度噴灑於果樹，可防止果實之落果。

以上各優點，均經實驗證明，確有奇效。特此聲明。

日星實業股份有限公司 謹啟

主要適用作物：果樹，蔬菜，花卉，水稻，菸葉，香蕉等。

適用病害：疫病，炭疽病，白粉病，銹病，黑點病，斑點病，露菌病，赤星病，白絹病，晚腐病，苗立枯病，水稻白葉枯病，立枯病，香蕉葉斑病，稻草消毒，土壤殺菌，其他細菌性病害。

使用倍數：2000倍—3000倍。

使用方法：病害發生時每隔2~3天散佈一次，連續3~4次立見宏效。

特點

- (1) 藥液不染污農作物，收穫前亦可使用。
- (2) 低濃度就可發揮效力，藥劑極為經濟，普通使用濃度為（夏天3,000倍，冬天2,000倍）
- (3) 本劑有效成份之滲透性極強能滲入植物體內，所以對各種病菌均有優異的預防及治療效果，又因無毒性及刺激性，使用後對作物不發生藥害。
- (4) 土壤殺菌，種子球根之消毒效果甚佳同時亦可消毒農器具以防止病原菌之感染。
- (5) 各種果實，蔬菜，運送途中時常發生之病害可以使用本劑防治絕不影響其外觀或留污跡。
- (6) 本劑係完全水溶性所以施用後能使植物吸收少量藥劑而賦與對病害的抵抗力。
- (7) 本劑以4~10萬倍稀釋液可殺滅生存在水中的有害微生物如細菌，黴菌，毒藻或浮游藻類。
- (8) 時雨時晴的氣候下亦可使用本劑，因本劑散佈後即從葉，莖部滲入所以散佈一小時後下雨效果亦不受影響。

製造元

東京有機化學工業株式會社

日本 東京都北區豐島五之四

臺灣總代理

日星實業股份有限公司

臺北市南京西路五號之一 電話：47874・40550・40380

屏東分公司：屏東市民族路177號 電話36轉