


，乳缺猪母



！益收響影

趙法清

剛生產後不久的母猪，或在仔猪哺乳期間發生的母猪最多，大都是因為飼養管理的不得法，影響仔猪的育成率很大。

飼養母猪的農友，必須在母猪沒有分娩以前，仔細的觀察，主要還是要從改進母猪的飼料做起，那是最好的預防方法。

先問母猪為何缺乳

母猪缺乳的原因很多，一般母猪在成長期間，因為澱粉質飼料和脂肪質飼料餵得過多，長得太肥。會使母猪生產以後缺乏乳汁。

懷孕期中，如果蛋白質飼料不足，生殖器官發育不完全，或礦物質、維他命等營養份的不足，也會缺乳。

母猪運動不足。或因飼料、高氣溫、環境等的變化。有的是母猪患神經質，受遺傳因子

等影響，致使產後缺乳。

有的母猪，因為泌乳和乳腺發育關係而使內分泌不足，也是原因之一。還有是由於母猪受全身性疾病，或因難產、流產、乳房炎、乳熱、胎衣滯留等病的影響所致。

次看仔猪是否貧血

母猪缺乳因餵得太肥時，乳房內部組織由於脂肪的堆積，乳腺組織受到阻礙，便不能充分的發達，如僅以外觀來判定較為困難，一般泌乳不足的程度，可觀察仔猪的發育狀態，以皮膚的顏色，和盜乳等情況來判斷，總之缺乳時，仔猪都貧血。嚴重的乳房堅硬、充血、乳頭軟弱、倘用手指擠壓乳頭時，無乳或僅有少許幾滴分泌出來。

母猪缺乳，在產後二十四小時，或二十四小時以後較久發生的，產道內常見有白色粘液分泌物流出。甚至因腸內缺少運動，大便乾燥或量少，發生便秘、乳房發熱而充血等病徵。

再談飼料要能適應

預防母猪缺乳，必須注意下列各點：注意育成期間所餵的飼料成份和各種管理是否適當。尤須使母猪有適當的運動，分娩期間的清潔和消毒，以及公母豬生殖道有無疾病等。

懷孕期間，要餵良好的平衡飼料。同時多餵豆科牧草，保持良好的健康狀態。分娩前後，種母猪要減料，可餵給容易消化和吸收的飼料，如麩皮和燕麥等。分娩前後幾天，餵甲狀蛋白（Thyropo-tein），每磅飼料加一百毫克，可促進泌乳。

既然如此就要打針

母猪缺乳時，可按照下列各種情形分別施

乳牛幾歲開始配種？

小的母乳牛生下來以後，還沒有經過配種和分娩的統稱為「女乳牛」。至少要經過十四個月以後才能配種，配種後二百八十天分娩。

女乳牛第一次配種的適當年齡，要看乳牛品種，生長率各個體的發展等情形而定。如果體格太小或過早就給牠配種，不但很難能生產一個優良的後代來，而且會影響那頭女乳牛的發育和產乳量。所以女乳牛第一次配種年齡的選擇非常重要。在一切正常的情況下，各種女乳牛第一次配種的適當年齡如下：

荷蘭牛，十五至十八個月，體重約三百四十至四百一十公斤。

娟娜牛，十四至十八個月，體重約二百二十七至二百七十三公斤。

瑞士黃牛，十五至十八個月，體重約三百四十至四百一十公斤。

愛縣牛，十五至十八個月，體重約二百七十三至三百一十八公斤。

更娜牛，十四至十八個月，體重約二百五十至二百九十五公斤。

一般乳牛的懷孕期間約為九個月。（二百八十天），乳牛從配種後如確定已經懷孕，便可以根據懷孕期而推算牠的預定分娩期。在飼養管理和待產等工作上，可以早作準備，這在大規模的乳牛場尤其是很重要的。

這裏舉例說明乳牛自配種並懷孕後，以懷孕二百八十天計算的分娩預定期：

一月一日配種，十月八日分娩，二月十五日配種，十一月廿二日分娩，三月一日配種，十二月六日分娩，四月十五日配種，翌年一月二十日分娩，五月一日配種，翌年二月五日分娩，六月十五日配種，翌年三月廿二日分娩。

季培元