

### 葛藤採織有八要點

【問】：(一)葛藤可以採織維外銷之說，但野生葛藤有兩種，A為俗稱刈割藥用，B為葛藤有纖維細柴草用(附標本請鑑定)。

【答】：(一)就寄來葛藤樣品，A屬「栽培葛藤」，塊根可供中藥，或磨粉晒乾供食用稱「葛粉」。B屬「野生葛藤」，本省山野間分佈極廣，藤可供細紮用，葉可供兔及牛飼料。兩種葛藤均可採取纖維，供作編織紙門，或手工藝品，目前本省收購葛藤貿易商行有大振貿易有限公司(北市臨沂街七十二號二樓)及天元協興商行(北市信義路二段一一二巷二號)等。

【問】：(二)葛藤採織要點：(1)需採取當年生幼蔓每隔三十至五十天採割一次。(3)鮮蔓置大鍋沸水中煮，或利用蒸香茅之蒸鍋蒸汽煮，時間約二十至四十分鐘，視蔓之老幼而定。(4)煮沸後即浸淡水中經十四小時左右。(5)將水中蔓挑起堆積發酵，經四八至五六小時。(6)在清湖河水中洗滌。(7)再將纖維浸入米糠水或米湯水中經四小時。(8)曬乾。纖維長度須保持四至五公尺，打細後置乾燥處收藏。又本刊以後將介紹有關葛藤栽培採織等方法，到時請參考。(賴裕立)



消毒舊菇舍可使用

### 福爾馬林過錳酸鉀

【問】：洋菇舊菇舍消毒，用福爾馬林加過錳酸鉀混合，使其發生瓦斯，維持二、三日間之燻蒸消毒，是否有效。(雲林縣麥寮鄉麥豐村興化寮路十一號莊次雄)

【答】：消毒舊有菇舍，普通用福爾馬林液加過錳酸鉀，使發生氣體燻殺害蟲和病原菌，如果你的菇舍是草舍就要注意搭蓋的草是否够緊密，以免室內氣體跑出，燻殺效力減低，同時更要注意烟火，不可接近菇舍，以免發生火災。(胡朝仁)

### 大蕪萎縮病要預先預防

【問】：寄上大蕪病株標本，請問為何枯黃？怎樣預防？現在正在普遍發生如何防治？(雲林縣二崙鄉楊賢村七號李勝義)

【答】：寄來之大蕪病標本係萎縮病，由過濾性病毒引起，通常山蚜蟲、刺馬或人畜等媒介引發，至目前尚無藥劑可治，故應注意：(一)迅速拔除病株燒燬。(二)驅殺蚜蟲及刺馬。(三)栽種時不用罹病之鏟莖。(四)發病地避免再種植大蕪。(吳福壽)

### BHC防治浮塵子無效

【問】：據植物保護推廣方法，浮塵子及稍飛虱等防治藥劑列BHC，我曾使用但絲毫未見效，這項藥劑是在市面購自商人，是否藥劑有問題？目前用何藥防治最適？(羅賢林)

【答】：所寄來藥是BHC粉無疑，但BHC對浮塵子無效(植物保護推廣方法並未列BHC)，而僅對飛虱有效，故如有兩種害蟲同時發生時，應採用防治刺蝟藥劑或賽文或DDT等，可同時得到防治。施藥時應噴射稻莖基部及葉背。(張良傳)

### 雞剪翅是否有利

【問】：(一)請問剛剪出小雞剪翅是否後有利，容易長大。

【答】：(一)如何剪法，剪後用什麼藥止血。

【問】：(二)以後如何養育與管理。(彰化縣埤頭鄉豐原村稻路四五號許萬敦)

【答】：(一)幼雞剪翅並不利，亦不易易長大。其好處為節省飼料。但要注意因剪出時外觀不佳，且不甚適合一般人的習慣，因有些人喜歡吃雞翅。

【問】：(二)幼雞剪翅通常有兩種方法：一為把整個翅膀連骨全部剪除，於肢骨與腕骨間之關節處剪之。二為沿翅膀的骨剪除皮肌下側大毛翼部分即可。剪後塗擦碘酒，或用烙鐵止血。

【問】：(三)剪翅後的飼料管理和普通方法相同，但要注意，不要使雞互相啄傷口，以免養成食毛血癖。(李培元)

## 防治洋菇害蟲

**請用**

人畜無害的除蟲菊系  
殺蟲劑滅菇蠅

低毒性，速效性DDVP  
殺蟲劑克蟲靈、青蟲靈

**滅菇蠅**

PYRETHIN

大信農化工廠有限公司

遠銷東南亞，非洲，中南美。敬請採購，歡迎經銷。

**大信農化工廠有限公司**  
臺北市天水路15號 電話：44309•50945

高密度聚乙烯桶，不銹鋼壓力室  
耐酸，耐鹼，耐熱，耐冷，永不腐蝕  
永不破裂，不怕衝擊，不怕任何剝藥  
白色透明，外觀美，壓力強，重量輕價格廉

**本省首創！**

## 金龍牌萬年噴霧器

**主要產品**

動力微粒噴霧器	噴粉兼用機	動力噴霧器(大、中、小型)
背囊型噴霧器		高壓式噴霧器
掛式噴霧器		3 1/2 半自動噴霧器
全自動噴霧器		噴粉器

**永安實業股份有限公司**

本公司：臺中市東區十甲路101之1號 電話：6538  
臺北辦事處：臺北市南昌街1段72號 電話：21268