

鷄食過量青菜不利 糞如泥是消化不良

【問】：(一)我所養四個月大的鷄，對青料非常喜歡吃，尤其白菜，不知給與過多有害否？

【答】：(一)鷄給與「阿司卡利青」驅蟲藥，現下還有一隻翼下垂，不知何故？以那種驅蟲藥最有效經濟？

【問】：(一)鷄的糞便成黃泥狀，不知是何病？(二)臺中縣潭子鄉栗林村中山路一六二號傅明寬

【答】：(一)鷄隻多喜歡啄食青料，但因青飼料纖維素高，多食常發生其他營養不足，發育不良，同時纖維素過多，不易消化，而引起腹瀉現象。故青料的給與量，應為全日糧量的三分之一為宜。

(二)「阿司卡利青」驅蟲效果很好，但你應用後未見效，可能你的鷄隻有其他毛病，應請附近獸醫檢查一下，再對症下藥為妥。(三)鷄隻糞便有時為黃泥狀，這多半是因為受寒而引起消化不良所致。每鷄每日給與二片胃腸消炎片，連續給與兩日可治癒。(李登元)

狗胃炎注意護理 不可內服驅蟲藥

【問】：(一)狼狗可能因誤食金屬物會嘔吐，吐物中有血，當時雖經治癒，但以後早上還是常嘔吐青綠色唾液，且不飲食，倦伏地上，必需灌食喜澀「U」等才會好轉，但亦不能恢復，請問該病是胃炎或胃潰瘍？

(二)有何藥可根治？

【答】：(一)投食驅蟲藥二五%生豬安或一連球用法正確，可是每次均吐出，請問有何方法驅蟲。(南投縣埔里鎮中山路三五〇號李經歷)

【答】：(一)據來信所說，該狗可能患胃炎，患胃炎的狗常有嘔吐情形，因胃粘膜有損傷，故吐物中初時帶有血液，且因痛苦故平時常伏臥於地。

(二)胃炎尚無斷根的藥物，平時宜注意護理，如減食或絕食一、二天，然後分次給與少量易消化的食物，如肉汁、乳汁等，並減少飲水、保暖等。

(三)狗因患胃病，不宜於此時內服驅蟲藥，如經確診有內寄生蟲，而必需用驅蟲藥時，亦宜在動物正常時服用，否則不但無效，具對動物體有害。(李培元)

鷄禿頭是多產鷄

【問】：(一)鷄頭脫毛，其重者甚至延至頸部，膚色微紅，經擦盤尼西林、彈力殺蟲粉等均無效，請賜告什麼病，用何法治療。(二)臺北縣新店鎮大坪新村一巷十號趙鴻德)

【答】：(一)一般說來，鷄禿頭者多為多產鷄，此因其品質粗劣甚至延頸的羽毛容易脫落。這不是病，無須治療，當其在休產時即可恢復。(李登元)

母豬不發情可用藥催情

【問】：(一)在來種母豬，飼養七個多月，體重約一百二十磅，發育平常，迄今尚未發情，有何藥物可催情，此種豬有無留種價值？


(二)用藍瑞斯做母配杜洛克公，所生小豬發育如何？生產率在來種母配藍克夏公多或少，有無留種價值？(臺北縣寶寮鄉仁里村仁和街七二號簡金安)

【答】：(一)在來種母豬飼養七個多月，應該已發情二三次才對，母豬迄今尚未發情，是否太肥或太瘦等，如是應在飼養管理上改善，若在外觀上找不出原因而不發情，請試用腦下垂體荷爾蒙(請參閱本刊第十四卷第一期)治療。如果再不發情，以早期淘汰為經濟。

(二)藍瑞斯引進本省僅四年，母豬數目不多，故多為純種繁殖，在臺

糖種治場藍瑞斯母與杜洛克公雜交會做過幾胎試驗，但欠少正式報告，尚不能確定。

在目前臺灣養豬環境下，仍用在來母豬配藍克夏成一代雜交母豬，再配藍瑞斯公豬，成三品種雜交豬較妥。(張聯欣)



防治洋菇害蟲




請用
人畜無害的除蟲菊系
殺蟲劑滅菇蠅
低毒性，速效性DDVP
殺蟲劑克蟲靈、青蟲靈

大信農化工廠有限公司
臺北市天水路15號 電話：44309・50945

最佳輔助飼料

肥畜丹

鷄鴨用
家畜用



用法

猪	小	猪	每天每頭	2.5至3公分
	中	猪	每公升乾料加	2.5公分
雞鴨	小	雞鴨	每公升乾料加	3公分
	中	雞鴨	每公升乾料加	2公分
牛	小	牛	每天5公分	
	大	牛	每天10公分	

效能

1. 預防疾病(下痢肺炎)
2. 防治貧血，促進生長
3. 提高飼料利用率增加利益。

新農行飼料加工廠監製 宜蘭市康樂路114號 電話：403號