

貝茨維爾小型白色火雞的飼養經驗

簡明龍

貝茨維爾小型白色火雞品種的特性，以前在本刊十四卷第八期介紹過。從五十二年七月間由美國引進臺灣到現在，已經有十八個月了，牠們在臺灣的適應性如何？想是愛好火雞的農友所關心的問題。

適應臺灣氣候

貝茨維爾白火雞，在臺灣的氣候環境下生活得很好，所表現的成績也很理想，本文是說明飼養的實際成果。

孵出後一週接種雞痘疫苗，接種方法可參考豐年十四卷十六期和廿三期。

這種火雞除對雞痘的損失較大外，很少發生其他的疾病，截至五十三年底止，已經有二千四百多隻白火雞推廣到臺灣各地飼養，情形都很好。火雞對於雞瘟和新城病也有感受性，要在四週齡時接種那兩種傳染病的疫苗，接種法和雞相同。根據從孵出後到二十四週齡時的統計，火雞羣經過防疫接種後，可達到百分之八十三的成活率。

孵出後第二週，冷天則為四週，養在有保溫的巴達利式育雛箱中，三週至十週間，養在中雞用的巴達利中。十一週以後，放飼在有柵欄的放飼場裏。有人管理時，可放飼在野外，讓牠們自由採食青草的嫩葉和啄食昆蟲。可以節省不少的飼料。

飼料利用率高

從孵化出來到八週齡間，饑省農會出品的靈農牌幼雞飼料，含粗蛋白質百分之二十，並在飼料中酌量加入切細的青葱，幫助消化。

從九週到二十四週齡間，饑省農牌中雞料，含蛋白質百分之十七。

飼養到二十四週齡時，雄的重約十臺斤，雌的

重約六臺斤多。

自孵出到二十四週齡間，飼料的利用效率是四三。

二十五週齡以後，給予屏東縣農會出品的中母豬完全飼料。並且從九週後在飼料中加入百分之二十至三十的青菜。青菜缺乏時，酌量補充青貯飼料，例如糖蓴飼料等，讓牠隨意採食。

大小要分開養

火雞要和其他家禽類分開飼養，並且要老少分開，以免互相傳染疾病。此外，需注意飼養場地要保乾燥，防止發生疾病。

這種火雞滿八月齡可開始產蛋。在十三月齡時所產的蛋，平均重七十三公分。

第一年所產種蛋的受精率是百分之九十。孵化率是全蛋量的百分之六十七，對有精蛋是百分之七十四。

孵化率方面需要特別說明如下：本來火雞的孵化率常很低，為了改善起見，就利用該種蛋作孵化觀察，把種蛋放在立體孵卵器中，孵化到二十五天時，把牠從孵卵器中拿出來，放入備有保溫的發生盤裏，加上複蓋，讓牠利用自體溫度孵化，結果得到了以上的成績，關於這種方法等確實情形，要等詳細觀察後再作專文介紹。

火雞常會六親不認地打起架來，遇到火雞打架就要把牠們分開，並且把傷處塗上碘酒，不然打輸的一隻昏倒在地，會被其他的火雞如打落水狗一樣地圍攻，一直到死，還有別的火雞站在牠的背上踏個痛快！

長得快可賺錢

從上述各點來看，證明貝茨維爾種白色火雞很

能適應臺灣的環境，是一種值得推廣的火雞種。前面所介紹的飼養管理方法，是試驗性的呆板飼養方法，假如一般農友飼養，從中雞以後便可以多給粗料如青菜葉等，這樣可以減低飼養成本，因為火雞食量奇大，中雞時一定要讓牠們吃飽，只要吃飽，牠們就會長得快。

有一種觀念須要改正的，便是有很多農民朋友，來購買火雞雛時，常問這種火雞最大能長多重？要知家畜禽是一種經濟動物，養牠們，是想從牠們身上得一點利益，所以應該先考慮牠們長得快不快？只要長得快，飼料利用效率高，就能賺錢，這樣辛苦的飼養牠們也才有意思。



(攝陳國純)。雞火色白的養飼者作文本