

，第四星期是華氏一百零三度，濕度是百分之五十七至五十八，每天翻蛋至少五次。
用家鷄母帶領珠雞雛，比較珠雞母好，因為珠雞母喜歡把小珠雞帶領到濕草中去，並且帶領得很遠。珠雞母並且喜歡在野外棲宿而不同育雛房，所以爲了小珠雞的安全和健康，用家鷄母代替珠雞母，育雛成績比較好。

十四星期一公斤多

一隻大的家鷄母可以孵育二十五隻小珠雞。小珠雞應該關在戶內，等待朝露乾了以後再放牧。珠雞喜歡躲在戶外木架或樹上，爲了養成牠在戶內棲架，應由母雞從六週齡起帶領，使牠逐漸養成棲息在戶內的習慣。

火雞雛和普通雞雛的育雛室或育雛器，都可以同樣爲珠雞雛應用，傘狀育雛器開始的溫度是華氏九十五度至一百度，尤其前兩星期必須保持九十五

度，以後降低到九十度，立式育雛器只可在開始的三週齡時用，以後仍須把雛雞移到傘狀育雛器下。至於育雛室，必須消毒和清潔等工作同時並進，珠雞雛的飼養數不必多，以三十至四十隻爲一羣較爲適當。

珠雞飼料和火雞相同，雛雞飼料要含有蛋白質百分之二十五。在起初飼養期的十天，每天要餵四、五次，大概十四個星期，就可長到約一公斤多，供應市場的需要。

幾種家畜常用的：

嘔吐藥

·元培季·

嘔吐藥主要是用來解除家畜的食物中毒，但是使用時要爭取時間，要快！如果吐個不停則可用止吐藥。

不論用那一種藥物治療，事前都要請教獸醫來決定，才比較安全。

嘔吐藥可用來解毒

家畜食物中毒，或誤食有毒藥物和其他化學品中毒時，如果是才吃下去，毒物還停留在胃裏，可用嘔吐藥使它吐出來解除毒害。如果吃下去太久，毒物已進入腸子，就應另用瀉藥，使它瀉出，減少中毒的作用。

普通狗和貓容易發生嘔吐，豬次之，牛羊則極少嘔吐，馬不會嘔吐。所以應用吐藥時要注意。服用時可灌入胃裏，但灌注時要小心，不要灌入氣管內，否則有危險。

硫酸銅：用百分之一濃度的水溶液，但是先要把沒有溶解的結晶體除掉，以免腐蝕粘膜。狗的服用量是這種水溶液的五十西西，可在十分鐘內引起嘔吐，倘若已發生嘔吐，則經三至六次嘔吐後可重複再用。

灌嘔吐藥時間要快

硫酸銨：和硫酸銅相同，但作用較慢而少。狗口服百分之一的水溶液五十西西後經十五至三十分鐘後如不嘔吐，可重複一次。如再不嘔吐，可使它改服瀉藥，才可爭取時間趕快解毒，因為時間太久後，毒物可能已進

入腸道。

芥：用一茶匙芥子粉混在一杯溫水內口服，可使嘔吐，必要時經十五分鐘後重複一次。這種藥比金屬性的鹽類吐藥較爲安全。

中性鹽類：高濃度的中性鹽類都能刺激胃粘膜而致吐，作用慢而不很可靠。中性鹽類中用鉀鹽的較多。狗的用量是〇・二至〇・五公分。其他食鹽的效力不大，可試用一茶匙的乾食鹽放在狗的口腔背面，常可引起嘔吐。但這種只能用急救，最好再用別的吐藥爲宜。

吐根：用粉末，或用粉末和水混合來餵，豬和狗的用量是一至三公分，貓是〇・二五至〇・六五公分。

吐酒石：較毒，效力不大，但可用作吐藥，豬的用量是〇・二五至〇・六五公分，狗要〇・〇六五至〇・二公分，貓是〇・〇三二至〇・六五公分。

吐得不停用止吐藥

反之，動物如嘔吐不止，則可用止吐藥。先查明嘔吐的原因，把原因除掉，自然會痊癒。如果原因不明或原因雖已明白而不能除掉時，才可考慮使用止吐藥：

制酸藥：因胃酸太多而使胃炎所引起的嘔吐，可用制酸藥止吐，像重碳酸鈉〇・六至一・二公分，乳鎂二至八西西，石灰水五至十西西。

保護藥：用來保護已發炎的胃粘膜，避免刺激，不再嘔吐，這種保護藥如不溶性的鉍鹽、次硝酸鉍等，用量是〇・三至四公分。

胃鎮靜藥：主要是控制胃的感覺神經末梢，如「可卡因」，用量是五至十五公絲，配成水溶液口服。

中樞鎮靜藥：如溴化鈉、溴化鉀和溴化銣的合劑，有輕度的安眠作用，其他水合氯醛和巴比土酸類藥的安眠作用較強，都是用來控制嘔吐中樞，使它不再嘔吐。

如不用藥物則在腹部放熱水袋、冰袋、或放置抗刺激劑藥物亦有效。