

適合花蓮地區栽培的三個稻種

林友平

本省近年來水稻栽培，無論土壤肥料、灌溉農具、病蟲防治或耕種技術等，都有顯著的改進，但是品種的好壞，影響產量很大，花蓮區一般農友，過去常栽培來歷不明的品種，以至感染病蟲害，倒伏，脫粒，甚至減少收量。下面介紹適合花蓮地區栽培的幾種水稻品種，以供農友們選擇時參考。

嘉農二四二號

「嘉農二四二號」是豐產而抗稻熱病特強的優良品種，株高一〇・六公分，穗長二〇・七公分，有效分蘗數在十五至二十之間，每穗粒數平均一五六・七粒，着粒密，每穗分枝數平均一二・四支，穗重平均四・二公克，無芒，稃尖淡黃色，稃色淡黃，粒形稍圓，糙米百分率平均七九・六，谷千粒重平均二九・一公克，品質良好，能耐重肥。

生育日數和種植適期：生育日數第一期作一百一十五天，第二期作一百天。播種適期第一期作一月下旬至二月上旬，第二期作六月下旬至七月上旬。插秧適期第一期作二月下旬至三月上旬，第二期作七月上旬至七月下旬。

施肥量：每公頃每期施用硫酸銨六百公斤，過磷酸鈣四百五十公斤，氯化鉀一百六十五公斤。

年產量：第一期作五千零一十公斤，第二期作四千七百六十八公斤。

栽培應注意事項：本品種因植株高，容易倒伏，不適宜潮濕水田栽培。宜多用鉀肥，注意排水，使植株堅固，防止倒伏。吸肥性強，肥料施用量宜多，稻熱病抵抗性強，適合易發病地區栽培，但必須注意防治螟蟲。

適合栽培的區域：適合花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、玉里鎮和富里鄉的砂質壤土或植質壤土水田栽培。

嘉南八號

高約一百二十公分，有效分蘗數十五至廿二，每穗粒數平均一百五十粒，每穗分枝數約十二支。

生育日數和種植適期：第一期作一百二十二天，第二期作一百零三天，播種適期第一期作一月下旬至二月上旬，第二期作六月下旬至七月上旬。插秧適期第一期作二月下旬至三月上旬，第二期作七月上旬至下旬。

施肥量：硫酸銨六百公斤，過磷酸鈣四百五十公斤，氯化鉀一百二十五公斤。


年產量：第一期作四千七百六十二公斤，第二期作四千五百三十六公斤。

栽培應注意事項：本品種抗稻熱病比「嘉農二四二號」弱，應注意種子消毒和肥料三要素的配合。第二期作紋枯病發生機會較大，須注意防治。如果缺肥，容易發生胡麻葉枯病，要特別注意施肥量和施肥方法。

適合栽培的區域：本品種適合本區各鄉鎮灌溉便利的肥沃壤土或腐植土栽培。

臺中在來一號

蓬萊稻在水利方便的地方產量比在來稻為高，米質又好。但在水利不方便地方，較差的地方，在來稻反而比蓬萊稻好。「臺中在來一號」的抗病性較強，比較耐旱，矮生，不易倒伏，可以種植較老熟的秧。



「號二四二農嘉」種稻良優

苗。一株穗數十九支，稈長八三・八公分，穗長一十公分，一穗粒數八五・九粒，抗稻熱病強。

生育日數和種植適期：生育日數第一期作一百一十七日，第二期作九十六日。播種適期第一期作一月下旬至二月上旬，第二期作七月上旬至七月中旬。插秧適期第一期作二月下旬至三月上旬，第二期作七月下旬至八月上旬。

施肥量（公斤／公頃）：

第一期作	第二期作
硫酸銨 六〇〇	四〇〇
過磷酸鈣 四八〇	三二〇
氯化鉀 一五〇	一〇〇

年產量：第一期作五千六百四十三公斤，第二期作四千六百五十六公斤。

栽培應注意事項：本品種適宜於第一期作栽培，耐肥，不倒伏，可密植，但不適宜於第二期作栽培，如果第二期作栽培，不但肥料效果低，容易脫粒，並易患小粒菌病，日葉枯病，葉鞘腐敗病，以及浮塵子。製作田必需栽培時，則需特別注意施肥量和病蟲害的防治。

適合栽培的區域：本縣各鄉鎮都可以栽培。