

# 農友經驗

## 我怎樣種糊仔甘藷

栽培糊仔甘藷的要訣，是要提早種植而不使前作水稻受到影響，同時要使甘藷在氣溫尚未降低以前能充分發育，加強抗寒的能力。

我在第二期水稻收割前二十天，排去田間積水，等到微乾而還濕潤的時候，每隔四行稻欄約二尺四寸的距離，每行每支約有七節的健壯薯苗，田間經常保持濕潤即可，切勿積水，以免腐爛。水稻收穫前十天，每分地先施用尿素三公斤，收割後即行淺培土，施用腐熟堆肥約五千公升，硫酸銨四十臺斤，過磷酸鈣四十臺斤，氯化鉀三十臺斤，施在左旁。二十天後實行深培土，施用氮化鈣兩包，以後每隔三十天翻一次蔓。

一直到第二年水稻插秧前止，甘藷插下去後約經一百廿天。收穫的甘藷塊根，共有三千九百三十七臺斤。（苗栗縣卓蘭鎮四十一號陳錦泉）

## 預防分娩母兔的惡癖

母兔分娩時，尤其是才生一、二窩的，也許會發現母兔有一種惡癖，就是常常會吞咬仔兔，依我的經驗可以設法預防：

一、分娩的母兔，精疲力盡，性情很暴躁，如再吃不到水汁多的飼料時，常會吞咬仔兔，所以要供給充足的水和多汁的飼料。




二、初養兔子的人，對兔子的照料一定很用心，朝夕撫摸，如飼養者是一個抽煙的人，手上帶有強烈的煙味。當撫摸仔兔時，仔兔身上也帶有煙味，易引起母兔的吞咬仔兔。所以抽煙人摸仔兔時最好帶上手套。

三、仔兔窩所墊的棉花或其他保溫物，要保持清潔，不要讓母兔在上面積有大小便，因為有了臭味。母兔也會咬死仔兔。（高雄縣岡山鎮福興里二十二號楊宏男）

## 蕃茄壓條能生新根

我在五年前就開始種植蕃茄，在五年中間常常發現蕃茄田裏有很多缺株，我得到了一個改良的經驗。

當蕃茄生長到三十至四十公分時，在莖的基部選一個適當地點，挖一條淺溝，長約十五公分，把蕃茄莖的基部輕輕壓倒在溝裏，上面覆土，稍加鎮壓；如果植株稍有傾斜的話，可用較大的土塊抵住如左圖。



要注意的是應使蕃茄莖的基部露出土面，因為這樣可使蕃茄再生新根，易於吸收養分，植株較為健壯，不易變成缺株。

（臺中縣烏日鄉東園村七十七號涂炎校）

## 農藥成份標準 保證品質優良



現貨供應



巴拉松乳劑 P M 乳劑

馬拉松乳劑

安特靈乳劑

DDT 乳劑

地特靈乳劑

靈丹乳劑

魚藤精乳劑 利我農乳劑

速克丹乳劑

## 經銷處

臺北：新隆泰農產行  
宜蘭：陳慶興農產行  
桃園：豐年農產行  
苗栗：泰生保苗行  
臺中：遠豐行  
臺北市：中山北路一段249號  
臺北市：中山北路一段231號  
桃園縣：中壢鎮民權路35號  
苗栗縣：竹南鎮八德街45號  
南投縣：南投鎮民權路113號  
臺中市：向上路一段2號之5

彰化：美豐行  
彰化：德榮行  
雲林：恩豐行  
嘉義：年豐藥行  
臺南：遠東農產行  
高雄：富農種苗行  
臺中縣：樂善鄉中正路327號  
彰化市：民生路166號  
雲林縣：虎尾鎮光復路48號之1  
嘉義縣：竹崎鄉六桂村3鄰199號  
臺南市：公園路173號  
高雄市：林森一路150號

屏東：元山化工行  
花蓮：邱成祥種子行  
臺南：中山路8號（彰化銀行對面）

中農化工廠股份有限公司  
總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660-28895  
工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932154