

農業信箱



臺南一號四號水稻

那種產量高抗病強？

【問】：(一)臺南一號和臺南四號那一種較適合第一期作？

【答】：(一)臺南一號和四號在第一期作那一種產量較高抗病性強，而不宜倒伏。

【問】：(二)在第一期作，在來種的產量都一定比蓬來種高嗎？(雲林縣西螺鎮廣福里大同路七號張德凱)

【答】：(二)該二品種均可適應第一期作栽培，但臺南一號適應土壤肥沃地，臺南四號適應土壤肥度中等之地栽培。

【問】：(三)若在土壤肥沃地栽培時，臺南一號較臺南四號產量高，如在土壤較瘠地栽培時，臺南四號較臺南一號產量高，抗病熱病及倒伏性均以臺南一號較強。

【答】：(三)水稻栽培環境不良地區栽培在來稻時產量較外，其餘可種水稻地，栽培蓬來稻產量均比在來稻高。(莊南路)

注意肥料配合施用

減輕稻黑腫病為害

【問】：(一)稻葉上縱向小黑色線點是何病。

【答】：(一)一半以上的谷粒變成黑褐色，致成不實谷或破洞而呈灰色枯死，以為穗稻熱病試噴「富米農片劑」(農會賣的)，每片加水四、七公升，噴藥時間為傍晚，結果更嚴重，附上噴藥與不噴藥標本請鑑定。(臺中縣大里鄉大元村大元路三七之一號廖繼順)

【答】：(二)根據你寄來稻葉標本是一「稻

有不良後果。(簡錦忠)

藤竹混植相思樹

可得混交林利益

【問】：(一)藤竹與相思樹混植可否？有何不良影響？

【答】：(一)栽培後第二年再砍相思樹可以嗎？(相思樹已成林七至十年生)。

【問】：(二)在何處可買到藤竹栽培參考書？(四)藤竹隙地可以栽培山珠兒豆覆蓋綠肥嗎？(草屯鎮御史里東山路三九號陳振盛)

【答】：(二)藤竹與相思樹可以混植，並無不良影響，混植時林內濕度較高，適合于藤竹所需要的生育條件，同時颱風對藤竹之傷害可以減輕，藤竹較一般竹類怕風，括風如傷害竹葉與竹桿的程度大，便會影響藤竹發育和生長。

【問】：(三)藤竹栽植于相思樹林內，如果實行除草、施肥、培土、敷草等集約栽培，約第三年，竹桿漸達五、六公尺，已可開始採筍，此時應將竹權週圍相思樹予以部份間伐，以便藤竹獲得必需之陽光與土地，藤竹種植後，如將林中全部相思樹砍除，便不能再得到混交林的二項利益，最好在砍除相思樹以前三、四年，先行栽植一部份相思樹幼苗，以便砍除老樹後，幼樹也漸次生長，繼續維持混交林狀態。

【答】：(三)藤竹栽培可以參考農復會森林組出版「竹林之經營」一書。

【問】：(四)藤竹林中如土壤十分暴露缺少覆蓋時，可以種山珠兒豆、候山珠豆生長極茂盛時割取覆蓋在藤竹基部，對發筍與節的品質均有益處。(江滿)

正豐農藥

增加豐收的 正豐牌農藥 之水稻、果樹、茶葉、大豆、菸草、蔬菜、等害蟲防治用劑！



特殺松乳劑	青蟲、絲蟲、吃心蟲、蚜蟲、負泥蟲、浮塵子。
寶利多乳劑	介殼蟲、吃心蟲、螟蟲、青蟲、蚜蟲、捲葉蟲、浮塵子。
美粒松乳劑	螟蟲、絲蟲、蚜蟲、浮塵子、青蟲、負泥蟲。
能敵師乳劑	龜蠅、負泥蟲、蚜蟲、吃心蟲、螟蟲、浮塵子。
正滅松乳劑	螟蟲、毛蟲、蚜蟲、夜盜蟲、茶細蛾、浮塵子、薊馬。

正豐化學股份有限公司 公 司 臺中縣霧峯鄉草湖路二號 TEL. 63
連 絡 處 臺北市漢口街一段五七號 TEL. 39459