



種植香蕉冬蕉

全年施肥六次

【問】：(一)香蕉在幾月份發育最快？何時最宜種植？

(二)香蕉全年施肥幾次，何時施肥較宜？

(三)主要病蟲害發生於何時如何防治？(臺中縣和平鄉自由村九鄰五三號吳清順)

【答】：(一)香蕉在春季發育最快，夏季發育較慢，最宜種植期為三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、一月份共施六次。冬蕉應于四、六、八、九、十一、一月份共施六次。山地蕉應于二、四、六、九月份共施四次。

(二)香蕉每年應于六、八、九、十、十一、一月份共施六次。冬蕉應于四、六、八、九、十一、一月份共施六次。山地蕉應于二、四、六、九月份共施四次。

(三)九、十一、三月係象鼻蟲發生時期，應逐月噴五十倍地特靈可濕性粉劑七百倍稀釋液，同時注意清潔。一至二月及四至五月係介殼蟲發生時期，應噴大利濃一千二百倍稀釋液防治。雨季時(六、八、九月)易發生葉斑病，故應於雨季前開始逐月噴「大生」粉劑四百倍防治。(王兆全)

梅在平地多不結果

要結大果必須嫁接

【問】：(一)我有未嫁接的梅樹五、六尺高，均未結果不知是大粒或小粒種，有人說必須嫁接大粒種才會有收成？也有人說不須要嫁接，不知要如何處理才好？

(二)梅種有幾種？

(三)無嫁接幾年結果，嫁接前幾年能結果。(花蓮縣光復鄉中山路一二〇號鍾振祥)

【答】：(一)梅樹宜種海拔較高山地，平地多不能開花結果，大粒種葉較小粒種為大，梅無論嫁接與否，均能生果實，但嫁接後其果較大些，現在臺灣栽培的梅僅有大粒與小粒兩種。

(二)未嫁接苗第三年即可開花結果，嫁接苗第三年亦可結果，要結大果必須嫁接。(朱長志)

提早鳳梨開花結果

可用電石夜間處理

【問】：(一)鳳梨用何種促進劑處理比較信用可靠？

(二)預定農曆五、六月間採收的鳳梨，應於何時處理為宜？

(三)經過處理後施肥時注意何事？(嘉義市安樂街五二號陳明資)

【答】：(一)目前為促使鳳梨提早開花結果，多採用電石(電土)處理較為安全可靠，其使用方法為一百公升水加半公升至一公升電石塊(〇.五至一.〇%)，待其快溶解完時，裝入水壺內，灌注於鳳梨植株基部，每株約五十公撮，處理時間以夜間零時至日出時處理效果最佳，隔三、五天再用同樣方法處理一次。電石可在市面上五金行或雜貨店購買。

(二)農曆五、六月等於國曆六、七月，不加處理自然結果的夏果，早成熟者也有在此時成熟，如於十一月間電石處理者，可在六月間成熟採收。

(三)電石處理後七至十日須施肥一次，不可過早或過晚，每株施用混合肥料三十克於葉腋，謝花後一個月再施一次。(黃季春)

無核番石榴味好

可惜產量並不高

【問】：(一)本省是否有無核番石榴？其原產地在何處？適合什麼土壤，氣候，在臺灣何處有這樣的種苗？

(二)四季石榴被霜凍死，再發出的新芽，結的果實很不可口，是否可以再嫁接？(桃園龍潭鄉上林村溝東十一號羅清榮)

【答】：(一)無核種番石榴，現在彰化縣永靖鄉的商業苗圃有種苗出售，品質很好，但產量不高，缺乏經濟價值，對風土的適應性與普通種番石榴相同，來源是巴西。

(二)四季番石榴都是嫁接種，嫁接部份如經霜凍死，再從根節發出新梢，成長後所結果實便與嫁接種(四季番石榴)不同，可以再行嫁接。(張振甫)

農友們！選購優良可靠的種子

蘆筍——美國美麗華盛頓五〇〇九號。現貨供應。

其他適於春夏季種植的——

長岡交配四季種甘藍、長岡交配六〇甘藍、坂田中早生甘藍、高農光悅甘藍、高農秀悅甘藍、長岡交配耐病五五白菜(本品種經去年在本省各地栽培結果，證明是獨一無二完全耐病，栽培極為容易，已獲得種植者的普遍歡迎。)長岡交配六十日白菜、坂田濱光白菜、武藏野寶冠一號、二號蕃茄、武藏野夏冠一號、二號蕃茄，高農福壽一〇〇號蕃茄、高農八號蕃茄等不及細載，歡迎選購，價目表函索即寄。

贈送蘆筍與瑞典燕青栽培法函索即寄

輸入大三貿易有限公司
經銷大豐種子行

公司：高雄市七賢二路六二號
電話：二一四八八號
行址：高雄市建國三路二〇三號
電話：二二八三四號
劃撥儲金：高字四〇二七七號

豐年讀者服務部

新春書刊大贈送！

緣姻鷄養

，導指術技生先統銘翁家專鷄養
生事故，明說圖環連部全，印編刊本
。寄即元二票郵附，用實容內，動

年千七用利地土

地土服征圖企類人，印編廳林農
直，發出地聖教督基代古從，實史的
來年千七，岸沿洋平太國美的天今到
的用利地土出指，事故的痛慘和樂歡
。寄即元二票郵附。徑途確正
元四票郵附請的本兩要時同

