

柑桔園可間作矮香蕉

【問】：(一)五年生桶柑及雪柑，行距十
六台尺株距十八台尺，中間擬種植矮種香蕉
是否可？如改種木瓜是否比香蕉有利？應
種幾株？

【答】：(一)在五年生柳橙行距十二尺株距十二尺
，中間是否可以種植香蕉或木瓜？
(二)以上兩種果樹何時種植較適合？何處
有售種苗？其他作物以那一種較適合？(臺
東縣鹿野鄉瑞豐村廿八鄰二號林火炎)

【答】：五至七年生桶柑或雪柑，依行
株距視之可間作矮蕉，目前政府獎勵山坡地
種蕉，且香蕉比木瓜有利，如種香蕉，株距
十八台尺最好中間種一株。
(二)可種香蕉或木瓜一二年。
(三)香蕉以三四月種植為佳。木瓜以十
一十二月或三四月種植。

【問】：(一)茲附寄標本
請問此苗是否美國華盛頓種
種蘆筍可與甘藍間作



【問】：(一)此苗優劣如何？
(二)以現時中部之氣候種
種蘆筍如要間作？以何作物
為適宜？(彰化縣二水鄉一七號孫高鏡)

【答】：(一)所寄來的苗株無法判定，是
美國產或本省產種子育成之苗，須俟定植後
四十五個月始可判別。一般本省產種子顏色
較黑，其發芽率甚高，(超過九十%) 苗株
之發育亦甚速，但莖較細。

(二)所寄的苗株屬於瘠地苗床所育成者，
貯藏根雖多，但較細含糖率差。播種後之覆
土厚度稍嫌不夠，地下莖的鱗芽無法獲得足
够的水分，變為木芽屬於中等以下之苗株。
(三)宜與甘藍、花椰菜、球莖甘藍等間作
，避免與高性作物間作(王進生)

小茴香的栽培要點

【問】：友人從國外帶回不知名的種子
，據說莖部結球味美，經香結果可能是小茴
香附種子及苗請問：
(一)是否小茴香。
(二)栽培方法如何？生育期有多久？
(三)有無經濟價值？
(四)莖部或主根是否結球？
(五)是否可做菜食用。(桃園縣大園鄉大
海村倒厝仔十五號郭雨文)

【答】：(一)是小茴香。
(二)適於排水良好的砂壤土或粘壤土，三
月播種，經一箇月後移植，株行距各四十五
公分，五月中旬中耕除草及施肥，施肥量每
分地大豆腐一百公斤，過磷酸鈣四十公斤，
草木灰四十公斤，全量施用，種子採收期為
八至九月，但一般以第二年採收種子較佳。
(三)子實有健胃、驅風、祛痰及香料用。
(四)不結球。
(五)莖葉可做菜食用。(楊水裕)

草木灰屬於灰類肥料

【問】：(一)氮化鈣、水肥及過磷酸鈣
等肥料不可混合，但要做基肥施用時，應先
施下那種，並經幾天後再施第二種，或有其
他更好的施用法？
(二)請問草木灰與灰類是否不同？
(三)豆餅是否優良肥料，三要素含量如
何？(臺北縣萬里鄉國聖村八斗四三號蔡蒼
明)

【答】：(一)所問各肥做基肥時應先施下
氮化鈣，並與土壤充分混合，經一星期或
十天分解後再施水肥，過磷酸鈣為宜，氮化
鈣如能先製成速效堆肥後施用更佳。
(二)草木灰為代表農業上自給肥料的稱號
，應包含在灰類內，普通農業上可利用的灰
類有木灰、藁草灰、潤葉樹灰、針葉樹灰、
菸草葉灰及煤炭灰等等。
(三)豆餅為一種有機質肥料，據農肥公司
過去試驗結果其施用量，最好不超過氮素用
量的五分之二為宜。其所含三要素為氮六.
五六%，磷一.三七%，氧化鉀二.一四
%。(吳石生)

家禽的救星 **禽聖片 A.C.M**

專治：雞、火雞、鴨、鵝
傳染性腸炎、小鳥等病、傷寒、球蟲病、
肺炎、呼吸器病、球蟲病、
傳染性下痢、慢性肺炎、
家禽傷寒、球蟲病、
傳染性下痢、慢性肺炎、
、輸卵管炎、消化不良
、症。


包裝：每小包14片裝，每
盒50包裝，500片裝，
2000片裝。
(農畜衛可字第0336號)

最佳的獸藥 **綜合素 Antimycin**

專治特效：
豬肺疫、豬丹毒、傳染性腸炎、下痢、注射反應及
其他細菌性化膿性諸疾患。

用法：肌肉注射用。
包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶
裝(農畜衛可字第0338號)

太平洋製藥有限公司
說明書備案：臺北市中山北路1段105巷90號 電話：47086



要農作物增收請用 **酵素劑 香蘭**

使用香蘭優點：十天可作成完熟堆肥，腐熟促進，肥效增進。
糞尿速成優良肥料，老化土地之更新，病蟲害預防，果實加甜味蔬菜繁
茂提早收成增加產量。(說明書函索即寄)

春蔘甘藍請用

宇治交配脫普甘藍，U.S.M一號甘藍，坂田交配黑葉理想甘藍。
三季時中早生甘藍，金力甘藍，其他長岡交配夏天美濃一號大根
，日本黑葉系美濃早生大根，時無大根，包心高直，縮細甘藍，各種交
配蕃茄，ミンスラ、加州五、○蘆筍現貨供應。
美國美麗華盛頓蘆筍，日本大葉波菜及其他各種種籽均備。
實冠一、二號，夏紅一、二號蕃茄種籽，每包三十元。
E.S. PH 簡易土壤酸度計，捕鳥網(カスミ網)等均備。

總代理 **臺灣農產企業公司**
經銷 **臺灣農業資材公司**

臺北市地化街一段八十六號
電話：四四二五三、四二三六五
劃撥儲金：一二七九九