

# ？風防樣怎園蕉

濤江

除了這兩個敵人，我們就會生產更多與更好的香蕉。現在讓我們談談防風風害的問題。

因為本省中、南部香蕉生產區域，在夏秋之間，常受颱風為害，將熟葉的果枝折斷，或將整個蕉株吹倒，蕉農成年辛勤的成果，頓時損失殆盡。除颱風以外，本省西部沿海地區（離海岸線約十公里以內），如果種植香蕉也應注意，冬季和夏季季節風為害，尤其是冬季季節風。冬季季節風在臺中、臺南一帶風向多為自北向南，風速多為每秒七、八至十公尺，通常會將蕉葉及蕉幹搖動，雖不足以造成機械性的為害，但使蕉園內土壤水份蒸發加速，如果在冬季十分乾旱的地區，應該特別注意防止土壤水份蒸發太快，以免影響香蕉的生長發育。

下面介紹幾種可以採用的防風措施：

一、冬季季節風較強的區域，在九月中旬左右，至少應該在香蕉植穴附近或全部地面用蔗葉或稻草加以覆蓋，可以減少土壤水份蒸發。

柱，設立支柱可以減少颱風搖動蕉株和風折，過強的颱風，支柱也可能被吹倒。


三、為長久之計，蕉園應該造防

風林。造防風林的方法很簡單，先就選擇樹種談一談，再說栽植的方法。

選擇防風林有三項原則：第一、生長迅速，第二、易於繁殖，第三、避免造成香蕉病蟲害的中間寄主。根據這三種原則，一般認為竹類為最理想之樹種。

其他可用的樹種很多，現在將適用的竹類名稱和幾種樹種的造林方法，適合的海拔地區和附帶條件列舉如次頁表格。

栽植和排列的方法：



林風防植物園蕉

現貨供應

農藥成份標準  
保証品質優良



巴拉松乳劑  
PM 乳劑  
安特靈乳劑  
地特靈乳劑  
馬拉松乳劑  
DDT 乳劑  
靈丹乳劑  
魚藤精乳劑  
利我農乳劑  
速克丹乳劑

經銷處

臺北：新進家農產行  
臺北市迪化街一段249號  
宜蘭：建興農產實業行  
臺北市迪化街一段231號  
桃園：豐年農產行  
桃園縣中壢鎮民權路35號  
苗栗：惠農行  
苗栗縣竹南鎮八德街45號  
南投：泰生保畜堂  
南投縣南投鎮民族路113號  
臺中：進豐行  
臺中市向上路一段2號之5

彰化：美豐行  
臺中縣霧峯鄉中正路327號  
彰化：德榮行  
彰化市民生路166號  
雲林：惠豐行  
雲林縣虎尾鎮光復路48號之1  
嘉義：年豐農業行  
嘉義縣義竹鄉六堆村3鄰199號  
臺南：蓬萊農業販賣行  
臺南市公園路173號  
高雄：富農種苗行  
高雄市林森一路150號

屏東：元山化工行  
屏東市中正路90號  
花蓮：海裕成種子行  
花蓮市中山路50號（彰化銀行對面）

中農化工廠股份有限公司  
總公司：臺北市南陽街21號2樓 電話：31660-28895  
工廠：臺北縣景美鎮中正路317號 電話：932154



用農路，很是實水，又可兼做  
農路。用平臺增段臺灣者等所設計。  
的「踏步式洩槽」，既可排  
水，園份省大部本  
們，常當利農道缺蕉農香園份省大部本  
用。〔壓綿溶〕

樹種	造林法	海拔高度 (公尺)	附帶條件
濕地樹	植樹造林	300—500	用觀音竹爲下木
琉球松	植樹造林	0—300	用觀音竹爲下木
相思樹	植樹造林	100—200	用觀音竹爲下木
大葉桉	植樹造林	100—200	用觀音竹爲下木
白千層	植樹造林	100—200	用觀音竹爲下木
銀合歡	直播造林	0—1000	用觀音竹爲下木
木麻黃	植樹造林	0—300	用觀音竹爲下木
莿竹	栽植竹苗或 分株或扦插	0—1000	用觀音竹爲下木
長枝竹	育苗造林	0—1000	用銀合歡爲下木
觀音竹	分株造林	0—1000	，適於中南部
八芝蘭竹	植樹造林	100—200	
大葉桃花心木			

尺。竹類病蟲害很少，最適於蕉園防風林栽植。如用樹木爲蕉園四週防風林，應栽二行以上。用三角形植樹法。如土地價值不過高，或在風力強烈地區，可栽三至七行。凡用木下枝自然枯萎，如無下木，則防風效果減低，同時音竹、銀合歡或灌木爲下木；因此等樹種，成長後下枝自然枯萎，如無下木，則防風效果減低，同時失去代替生籬作用。

#### (乙) 蕉園內部

臺灣省政府農林廳  
農藥登記證第0154號

防治：豆類、  
西瓜、  
蔬菜等  
白粉病。



柑桔：銹蜱、  
蜘蛛、象皮病。  
小麥：銹病。

製造元：日本日產化學工業株式會社  
總代理：日星實業股份有限公司

現貨供應：年豐農藥行 地址：新竹六桂村199號 電話：義竹局24號
聯豐行 地址：屏東市民生路194號 電話：1859號

