

# 樂育鬆

## 再一次 萬份 免費大贈試

農友之苦悶  
因為產品枝細  
纖維過多  
製造後未達  
國際標準

以後怎麼辦？

用樂育鬆  
可使品質改良  
產品提高  
幼苗肥大

1. 免費試驗樣品辦法  
2. 適合於試用土壤為砂質壤土, 填質壤土, 輕質粘土, (但海墳及溪床之純砂質地請勿使用)  
3. 每戶限贈一份, 自即日起, 以一萬份贈完為止。  
4. 希望「贈試樣品」而試用者請信內附來八角郵票一張, 並將地址寫明投寄公司或自己寫好回程信封, 貼妥八角郵票一併寄來更佳。

歡迎各地農友, 多介紹親朋參加試用勿失機會, 並將試用經過及其結果惠賜此評指教為荷。

總代理：信德貿易股份有限公司  
臺北市中山北路二段九六巷四一號之六  
郵政劃撥儲金帳戶第5635號  
電話：42906號

八折大優待！！

凡經試用過之農友請來試用  
超過者以定價之八折優待  
期間：五十四年三月一日  
至五月卅一日止

(四) 七十日早 是由福建省引進之在來品種，屏東地區稱為恒春種，或新三號。本品種栽培地區為臺北、新竹、苗栗、桃園、宜蘭、屏東、高雄、臺東、雲林及嘉義等縣。以臺北、新竹和苗栗縣栽培較多。長蔓、匍匐性、分枝少、塊根形成長、生育日數一百四十五天；屬早熟品種。

春植三四月為種植適期，抵抗縮芽病及蔓割病力強。春植每公頃鮮諸產量會達三萬二千公斤，品質稍差，製粉率為二十一至二十九%，製粉率有十二至十三%，感光性遲鈍，耐濕不旱耐。

(六) 紅心尾 本品種為目前栽培面積最廣之在來品種，全省均有種植；以雲林、彰化、臺中、南投、花蓮、臺東、嘉義及苗栗等縣較多。蔓

春植三月為種植適期，抵抗縮芽病及蔓割病力強。春植每公頃鮮諸產量會達三萬二千公斤，品質稍差，製粉率為二十一至二十九%，製粉率有十二至十三%，感光性遲鈍，耐濕不旱耐。

早晚，土地之肥瘠，均無選擇。耐旱、塊根、水份多，故鮮諸收量高，以致農友多喜種植，唯本品種因水份過多而品質劣，含營養分低，食味也不好。

## 把握適當種植時期

本省雖全年均可種植甘諸，然而春作甘諸的栽培方式，品種特性及氣象條件等特殊，故有其特殊的適宜插種時期。北部以四至五月，南部以三

至四月為種植適期。晚早種植因氣候溫度尚低，發育不良。過晚種植，因氣溫過高，莖葉繁茂、徒長，均為不好。故應當把握適當時機，方可有良好的收量。

## 注意防治地下害蟲

春作甘諸，因生育期中氣溫較高，甘諸蟲害為害極烈；應特別注意地下害蟲之防治。地下蟲害主要有猿葉幼蟲為害鮮諸表皮，及瓶諸象鼻蟲為害鮮諸內部。

防治甘諸象鼻蟲及猿葉幼蟲等，用四十%阿特靈可濕性粉劑，每分地約一臺斤，泡成二擔水，在整地做畦前，用噴霧機在圃場全面撒佈後，應即翻耕，以免陽光照射而失却藥效。

## 選用優良的先端苗

甘諸苗的好壞，對塊根的收量影響很大；因為優良苗，發育健全，發根迅速，且發根數多，因此形成塊根的機會也多。一般春作諸苗，由秋作本圃採取，必須選擇節間短、節數多、健全粗大的先端一尺長左右者為最好。徒長苗、發根苗、基部苗等，均為不良苗，不宜採用。

同時宜在種植前用稀釋一百至二百倍的二十五% DDT 乳劑浸苗一分鐘。在甘諸生育三個月後塊根肥大時，在畦上塊根頭部露出土面的裂縫如噴酒一至二次稀釋一百倍 DDT 乳劑，則效果更好。