

表二：菸葉複選表解

菸把捆包工作須由經驗豐富的技術工人擔任，方法和複選工作相似，先將堆積的菸把先分過厚薄葉，然後按菸把的色澤、品質、葉位、長短、寬度、病斑與損傷程度等慎重選別後，分級打包。菸包重量普通以厚葉三十臺斤，薄葉二十五臺斤為標準。


菸把的繩綁，可由普通工人充任，必須配合復選進度當日綁把完畢。每一複選技術工人，應配有二至三名綁把工。方法：將複選過的各色各級菸葉，再按長度分為長、中、短三類綁把。菸把不可過大，一般以把頭一臺寸（則厚葉二十五片，薄葉三十片）為標準。綁把用菸葉，由把內菸葉抽出一片取用，不可用不同類葉綁把。

菸把捆包法

，但是不同級的菸類，不得摻合捆包。菸包外面用水泥紙包裹，堆積後待繳。

表三：菸把捆包分級方法表解

(以黃色類為例其他葉色類仿此捆包)



龍眼嫁接為何不易成活？
龍眼嫁接所以不易成活，是因為龍眼體中含有
多量「單寧」，嫁接時，因為切面曝露空氣中，
單寧「膜化」，阻礙接穗和砧木的癒合。一、二年生
的苗木，除用靠接方法繁殖外，以截頭行嫁接時，
成活率通常只有二十至四十分之一。一般果農不以嫁
接，乃因成活率過低。(王)



(植物綜合微量元素・葉面散佈劑)

施葉養元

シオヤゲン

促進發育
預防病害
提高品質
提早收成
防止落果
增加收成



說明書函索即寄

協和化學工業股份有限公司

臺北市華陰街三九號 電話：46980

◎ 注意

1. 本劑係液體化學肥料，非植物荷爾蒙劑。
2. 本劑不可與石灰巴爾特、石灰硫黃合劑、松脂合劑、銅水銀劑、硫酸石灰等農藥混合使用。
3. 與本劑不可混合使用之農藥應於散佈本劑前後隔三天以上方可使用。
4. 散佈量使葉面罩上一層薄霧似的程度為宜。

請將使用經過連附 500cc
裝商標剪下一張 (250cc
裝二張) 一併寄來敝公司
者，另贈紀念品。