



預留二期秧田

可以播種花生

【問】：（一）準備留做二期作秧地的田，現在播種花生，是否會嫌過早？到花生收穫後，是否可趕得上二期作播種？

（二）紫雲英採種田收穫後，播種花生是否可以？到花生收穫後，是否可趕得上二期作。

臺北三〇八號水稻抗風性強

【問】：貴刊刊載的臺北三〇八號水稻

，適合季節風強的海岸地帶栽培，未知彰化沿海地區適合否？那期作較好，該品種之抗旱及脫粒性如何，何處可以取得種子？（彰化縣芳苑鄉博愛街五五號林進成）

【答】：臺北三〇八號，在臺北地區除含有鹽分之水田外，一二期作均可栽培，在彰化尚未試種。該品種抗風較強故脫粒稍難，抗旱則為中等。如需少量種子試種，可向臺北縣三重市重新路臺北區改良場接洽。（謝賢文）

建藥用石灰不含鎂肥

過磷酸鈣無中和作用

【問】：（一）含鎂肥的白雲石灰（苦土石灰），何處能買到，街上賣的（建築用）即

鑑山產的石粉是否？磷酸鈣硫酸鎂何處能買得？每份地施用量多少？

（二）過磷酸鈣及氯化鈣有含石灰否？有無石灰的功效？過磷酸石灰施多時，是否有許多的石灰份？（彰化縣和美鎮塗厝里和厝路九號陳萬金）

【答】：（一）含鎂肥的白雲石灰（苦土石灰），何處能買到，街上賣的（建築用）即

驅除該蟲，現預備鷄糞混合BHC粉劑作基肥同時驅除地下害蟲，兩種混合對於藥效肥效有否影響，又飛佈達與鷄糞是否可混用？（二）防治地下害蟲，單用BHC粉劑對該蟲效力如何？（雲林縣愛寮鄉海豐村四九號吳筆）

防治花生地下害蟲 不宜採用BHC

【問】：（一）我有六公頃左右的是地沙質土壤，地下害蟲發生甚多，想種花生前施藥

驅除該蟲，現預備鷄糞混合BHC粉劑作基肥同時驅除地下害蟲，兩種混合對於藥效肥效有否影響，又飛佈達與鷄糞是否可混用？

（二）防治地下害蟲，單用BHC粉劑對該蟲效力如何？（雲林縣愛寮鄉海豐村四九號吳筆）

【答】：（一）關於留作二期作秧田地，現在播種花生是可以，如無遇到霜害始能發芽，而才趕得上二期作水稻播種。但花生栽培面積小時，容易遭受風害。（洪再傳）

（二）紫雲英採種田收穫後可播種花生，但花生收穫後，可能趕不上二期作插秧。（洪再傳）

防治花生地下害蟲

光華松
二、三化螟蟲剋星

必殺松
效能保證 成份準確

巴拉松

光華農化工廠股份有限公司

廠址：桃園縣龜山鄉龍壽村尖山外四七號

農利多

水稻螟害特効藥

強力松

富美松

，氯化鈣含有六十%以上石灰，兩者副成分主要為石灰。過磷酸鈣施多，其在土壤中變成硫酸石灰（石膏呈生理的中性），不會有土壤中和作用。（吳石生）

（二）過磷酸鈣主要成份為磷酸鈣及硫酸鈣，持久性沒有「阿特靈」及「飛佈達」之長，且BHC的異臭藥味，常遺留於花生莢果或甘諸塊根中，故防治花生或甘藷地下害蟲，最好不要用BHC。（張良傳）

南部栽培胡麻注意四點

種植白木耳木柴

相思樹楠木最好

有何品種最好，何處有售？

(2) 每分地需肥料多少？

(3) 種子須用什麼藥劑消毒，種地須用什麼藥品消毒？

(4) 在臺南縣的旱地須注意那些事項？病蟲害如何防治。（臺南市建國路一九一號蔡忠明）

(答)：(1) 胡麻在本省南部播種適期為三月下旬至四月中旬。臺南改良場育成的臺南黑二號及臺南黑選出較優。可向該場換領少量種子試作。

(2) 肥瘠中等地，每分地施腐熟堆肥一千公斤，硫酸銻十五公斤，過磷酸鈣十五公斤，氯化鉀十公斤。

(3) 種子用「賜保根」粉拌種，每十公斤種子拌五十公克(0.5%)。土壤害蟲可用四十多阿特靈可濕性粉劑，每分地一合斤，加水二百到三百倍，平均撒施混入土中。

(4) 胡麻雖耐旱性強，但土壤過乾時須酌量灌溉，即開花初期及其後約十五日灌溉二至三次可增加收量。生育期有立枯病及青枯病發生時應立即拔除，其跡地撒布木灰，斑點病應避免施用過量氮肥，白粉病可撒布可利生一千倍液防治。害蟲有蚜蟲可噴射五十到馬拉松乳劑一千至一千五百倍液，紅蜘蛛可用鐵地旺或開路生可濕性粉劑八百倍防治。(陳春齡)

(問)：(1) 種植白木耳(銀耳)之種菌如何培養？

(2) 如不能培養，何處有供應種菌？

(3) 諸君知種植白木耳之樹木，以何種最宜？溫度及氣候亦請簡告。

(4) 可否介紹有關培養種菌及種植方法之外文書籍。（三重市民族街八十九號王文積）

(答)：(1) 白木耳種菌培養方法，是將白木耳孢子或組織，用人工純粹分離培養法，在馬鈴薯洋菜培養基上的菌絲塊，用移植針切取約四公厘大之正方塊(大點亦可)，放置於調製好的滅菌瓶裝培養基上，令其菌絲生長發育，佈滿全瓶時即是市上所售之種菌。

(2) 種植白木耳的樹木以相思樹及楠木為最適，溫度初期


為七十%，後期

為九十七%，氣候

以初春及秋木種植為佳。

(3) 目前沒有專書論述白木耳種菌培養方法。

(胡開仁)



柑桔外銷要經嚴格檢驗

(問)：(1) 現外銷的甜橙類有那幾種。

(2) 外銷柑的檢驗有何規定？(新竹縣新埔鎮大坪里一號薛錦煌)

[問]：高雄地區約在農曆元月十五日左右，甘蔗再留宿根，有何適當而早熟之作物可間作？(高雄市楠梓區中場里建楠橫路十號陳松)

[答]：高雄區農曆元月中旬留宿根之蔗田，可間作大豆、花生或花螺豆等，大豆以臺大高雄五號，花生以臺農一號等早熟品種為宜，宿根蔗田間作其他作物，多因宿根生長迅速，所以間作物必須甘蔗宿根處理後，立即下種才能獲得良好之收成。(胡達)

農友們！選購優良可靠的種子

蘆筍—美國美麗華盛頓五〇〇九號・現貨供應。

其他適於春夏季種植的

長岡交配四季梅甘藍、長岡交配六〇甘藍、長岡交配初秋甘藍、長岡交配

陽春甘藍、坂田中早生甘藍、高農光悅甘藍、高農秀悅甘藍；長岡交配

蕃茄，高農福壽一〇〇號蕃茄、高農八號蕃茄等不及細載，歡迎選購，價

性品種，栽培極為容易，已獲得種植者的普遍歡迎。)長岡交配六十日白

菜、坂田濱光白菜；武藏野寶冠一號、二號蕃茄、武藏野夏冠一號、二號

蕃茄，高農福壽一〇〇號蕃茄、高農八號蕃茄等不及細載，歡迎選購，價

目表函索即寄。

輸入大三貿易有限公司
總經理
贈送蘆筍與瑞典種
菁栽培法函索即寄

公司：高雄市七賢二路六二號
行址：高雄市建國三路二〇三號

電話：二二八三四號
劃撥儲金：高字四〇二七七號

子
行

高密度聚乙稀桶，不銹鋼壓力室
耐酸，耐鹼，耐熱，耐冷，永不腐蝕
永不破裂，不怕衝擊，不怕任何劇藥
白色透明，外觀美，壓力強，重量輕價格廉

遠銷東南亞，非
洲，中南美。

敬請採購，歡迎
經銷。

全省首創！ 金龍牌萬年噴霧器



主要產品

動力微粒噴霧器，噴粉兼用機
背囊型噴霧器
掛肩式噴霧器
全自動噴霧器
(凡有嚴重病蟲害如黑星、煤、潰瘍、疥癬、麻點、銀皮、日燒、蒂腐、青黴、綠葉、介殼蟲、果實蟲等病蟲害，及粗皮、落葉、不正形、外傷或霜害、果梗過長等均一

本公司：臺中市東區十甲路101號

臺北辦事處：臺北市南昌街1段72號

電話：6538
電話：21268

動力噴霧器(大、中、小型)
高壓式噴霧器
3/4半自動噴霧器
噴粉器

本公司：永安實業股份有限公司

臺農四號六號適合生食

【問】：(一)鳳梨定植至成熱需時多久？

(二)那一品種較為耐旱，屏東縣何時種植最適？

(三)臺農四號特性怎樣？

(四)那一種適於生食用。(

(五)鳳梨普通在八、九月間栽植，於第三年七、八月間成熟採收，約需二十個月，但在栽植後第二年九月進行催花處理，則可在第三年三、四月間成熟採收，約需十九—二十個月。

(六)鳳梨可謂耐旱的作物。鳳梨各品種間以熱葉及有刺之品種較為耐旱，如臺農四號、有刺黃皮、有刺紅皮、突目等品種。屏東縣栽植適期為八、九月間。

(七)臺農四號為開英種與馬立求斯之雜交後代，果徑約在十一—十二—五公分，果重約在一·〇一一—二公斤，果肉淡黃白色，軟且脆，組織鬆，果汁不甚多，但極甜，約在十九度(Brix)，為生食用品種，植株葉片有刺。

(八)臺農四號及六號，開英種之突目，砂糖等均為生食品種。(黃季春)

第五期 第卷五十年第

(九)那樣農四號特性怎樣？
(十)那一種適於生食用。(

(十一)高壓繁殖，根部發育非常良好，但是剪下來栽培時大多數不會生長，或經半年甚或二年也全部枯死，是何原因？

(十二)荔枝是否可用芽接法或嫁接法繁殖？
(十三)荔枝是否也可用芽接法繁殖？

(十四)那一種作砧木最為適合？如用同樹作砧木，其品質是否會變？何時接木較適合？

(十五)將番石榴(四季月拔)之種子繁殖，栽種後，一年始能結果一次，是何原因？(

(十六)新竹香山鄉中隘村五十七號邱福興)

(十七)荔枝剪枝剪取的時期非常重要，普通在四、五月壓條的，到九月中下旬或十月上旬，即兩季終了時剪下最適宜，因

這時的新根還是生活的，種在土中可以立即吸收水分，使壓條不致乾死。若經過長時間的乾燥天氣才剪下，往往有很多根早已枯死

，這種壓條種在土中，便很難成活。種植後半年乃至二年枯死的，應該是管理不善，與壓條苗無關。

(十八)荔枝芽接非常困難，目前仍以空中壓條法最理想。壓條最適時期是四至五月。

(十九)番石榴可以用補芽接法繁殖，冬品種的實生苗，應該都可用作砧木。品質不會變，五至十月最適合番石榴芽接。

(二十)實生苗常有變異，不能完全保持親本的原有特性，所以四季月拔的實生種，不一定是四季結果。(張振佑)

(二十一)春植番茄「馬娜里」「寶冠」較好
【答】：(一)春季播種番茄，以馬娜里或寶冠為宜，如現在開始育苗，於開花後果期品種是否適合，土質半砂土要用「番茄多旺」處理，因溫度在攝氏二十五至十五度間，是番茄著果適溫範圍。

(二)春植番茄因多濕的關係，特別注意排水，並經常噴射大生七十八，或二十二可濕性粉劑四百倍稀釋液，每隔七至十天噴射一次，預防疫病，如有青霉發生，宜噴射寶文八百至一千倍液防治。(王進生)

山南勝里南新路五十號李昆圃

椰子採收期因目的不同而異

(一)如何鑑別椰子採收適期？

(二)如何鑑別採下的椰子是否會發芽？

(三)如何培植椰子使其發芽？(高雄縣旗

另有DE-4型5馬力柴油引擎
均參加合作金庫實物貸款
請逕洽各地農會

裕隆汽車製造股份有限公司

臺北市信陽街十六號

備有說明書函索當即寄奉▶

荔枝宜用高壓繁殖 番石榴可用芽接法

(一)鄭含有荔枝(三月紅)將其高壓繁殖，根部發育非常良好，但是剪下來栽培時大多數不會生長，或經半年甚或二年也全部枯死，是何原因？

(二)荔枝是否可用芽接法或嫁接法繁殖？
(三)荔枝是否也可用芽接法繁殖？

(四)那一種作砧木最為適合？如用同樹作砧木，其品質是否會變？何時接木較適合？

(五)將番石榴(四季月拔)之種子繁殖，栽種後，一年始能結果一次，是何原因？(

(六)新竹香山鄉中隘村五十七號邱福興)

(七)壓條荔枝剪取的時期非常重要，普通在四、五月壓條的，到九月中下旬或十月上旬，即兩季終了時剪下最適宜，因

這時的新根還是生活的，種在土中可以立即吸收水分，使壓條不致乾死。若經過長時間的乾燥天氣才剪下，往往有很多根早已枯死

，這種壓條種在土中，便很難成活。種植後半年乃至二年枯死的，應該是管理不善，與壓條苗無關。

(八)荔枝芽接非常困難，目前仍以空中壓條法最理想。壓條最適時期是四至五月。

(九)番石榴可以用補芽接法繁殖，冬品種的實生苗，應該都可用作砧木。品質不會變，五至十月最適合番石榴芽接。

(十)實生苗常有變異，不能完全保持親本的原有特性，所以四季月拔的實生種，不一定是四季結果。(張振佑)

圓方牌農藥

克滅松乳劑

萬能松乳劑

稻特松乳劑

米農乳劑



圓方牌

其他各種農藥及尤多收，
美綠元，愛果麗等。

允發農化工廠有限公司

台北市西園路二段167號 TEL. 36549

椰子以何時最適宜，要看採收的目的而定。

如果是以取食果汁為目的，在果實已充分大時，便可採收，這樣可以取食最多的果汁。如以取食椰仁為目的，便需待果汁減少到最少量，而椰仁增大到最厚時採收。椰仁增到最厚的時候，也是胚體充分發育的時候，這種果實才有發芽的可能。充分成熟的果實，果殼是呈褐色。此外搖動果實，聽裏面果汁的響聲，可以判斷果汁的多少，也是決定成熟度的方法。

(2)首先掘一直徑約二呎的播種穴。用堆肥混合好土壤填充穴內。然後將椰子果實平臥放入，果實的最上部約與地面齊平。覆土的高度也以此為標準。然後在它的週圍用土培高，作成盆形，以便灌水。上面並需加蓋草類，經常維持濕潤便可。(張振南)

「十姐妹」「烏唇」 鳥雌雄鑑別法

(1)美國「金絲鳥」之雌雄鑑別法如何？

(2)發育正常之十姐妹，出生後約幾個月，方可再生第二代？

(3)烏唇鳥須在何種環境下，方可產生第二代？(指鳥籠言)鳥籠是否須要寬敞？(社頭鄉廣興村圳仔巷二號蕭濟敏)

(答)：(1)十姐妹雌鳥在外觀上從顏色、肛門、嘴及體型大小等都無法判定，且公母鳴聲亦同，故須待孵化後二至三個月聽其鳴聲來判別，即雄鳥發出「筆！筆！」的高音，雌鳥發出「的拉！的拉！」的短低音。「烏唇鳥」雄鳥下嘴黑色者為雄鳥，下嘴脣有白點為雌鳥。

(3)凡臺灣省飼鳥協會會員，即享有貨放金絲雀資格。

(三)三個月左右可再生。

(四)飼十姐妹鳥籠即可。(邱見堂)

(五)短(1)桃園種和盤克夏之一代雜種體型特徵是：(1)全身被毛黑色，(2)耳朵向上，(3)背部不下垂，(4)腹部不下垂，(5)鼻嘴短，(6)後肢站立，(7)頭部身體無皺紋。

(六)飼欣(1)桃園種和盤克夏之一代雜種體型特徵是：(1)桃園種之背部沒有雙溪種凹的皺紋，(2)桃園種之耳朵比雙溪種大型，體型很相似，不易識別但稍有幾點不同地方如下：(1)桃園種之耳朵比雙溪種小型，(2)桃園種之頭部及身體之皺紋少。雙溪種和盤克夏之一代雜種體型是會遺傳出來，桃園種就不會。

鷄糞粘結肛門

試用消炎片治療

(1)所問小鷄肛門有糞塊粘着，如為糞便的顏色，及有無其他徵狀，故無法確實答覆。該糞便如為白色則可能為雞白痢，無藥可以治療，宜早日淘汰。該糞便如為其他顏色而飲食仍能正常，則可能為一

(2)養鷄用那一種飼料較好？(臺中市民族路四號周劉美榮)

(3)所問小鷄肛門有糞塊粘着，但未知糞便的顏色，及有無其他徵狀，故無法確實答覆。該糞便如為白色則可能為雞白痢，無藥可以治療，宜早日淘汰。該糞便如為其他顏色而飲食仍能正常，則可能為一

般的消化道疾病而引起的鴉痢，稀糞粘着在肛門周圍，乾後結成糞塊，亦可能為慢性鵝球蟲病而引起。此種病徵可試用消炎片治療，可能有效，同時肛門附近粘着的糞塊，應小心除去。

(4)養鷄飼料可在市場買回各種原味飼料，根據鷄隻大小需要，自行配合，或直接購買配合飼料也可，但應根據鷄隻大小選購。(李培元)

「桃園」「雙溪」豬種 外觀體形的鑑別方法

(1)請問桃園種與雙溪種有什麼區別？如何看法？

(2)桃園種母豬交配盤克夏公豬的一代雜種，體形如何看法，請將頭部及身體部明細指示。(彰化縣福興鄉萬里村三號陳有堂)

(答)：(1)桃園種和雙溪種都是在來種之間，體形很相似，不易識別但稍有幾點不同

(2)桃園種之背部沒有雙溪種凹的皺紋，(3)桃

(4)背部不下垂，(5)鼻嘴短，(6)後肢站立，(7)頭部身體無皺紋。

適合多種作物，增加收量二成以上

化學合成肥料

五谷牌

△五谷肥：含有氮21%、鉀3%及植物生長要素多種，使葉莖強韌，促進生長，發育健全，不易倒伏，適用水稻、鳳梨、香蕉、竹筍、雜糧等。(可以混合磷鉀銨使用)

△磷鉀銨：水溶性的有機質肥料，容易被植物吸收，增強病蟲害抵抗力，提高品質及產量，適用豆類、瓜類、蘆筍、蔬菜、什糧等。

△青果肥：含有氮10%、磷3%、鉀3%、矽、鎂、鈣、鐵、錳等之綜合最新有機質肥料，改良土壤特有卓越效果，無需再施用任何他種肥料，最適合柑桔、香蕉、鳳梨、西瓜、蘆筍、蔬菜等其他作物。

台灣省檢驗局檢查合格
台製字第10002號



健興肥料股份有限公司
三重市大有街26~1號 電話：97-2791