

南部栽培胡麻注意四點

【問】：(一)胡麻在何時下種最適，最近有何品種最好，何處有售？
(二)每分地需肥料多少？
(三)種子須用什麼藥劑消毒，種地須用什麼藥品消毒？

【答】：(一)胡麻在本省南部播種適期為三月下旬至四月中旬。臺南改良場育成的臺南黑二號及臺南黑選出較優。可向該場接洽少量種子試作。
(二)在臺南縣的旱地須注意那些事項？病蟲害如何防治。(臺南市建國路一九一號蔡忠明)
(三)胡麻中等地，每分地施腐熟堆肥一千公斤，硫酸銨十五公斤，過磷酸鈣十五公斤，氯化鉀十公斤。

【問】：(一)胡麻在何時下種最適，最近有何品種最好，何處有售？
(二)每分地需肥料多少？
(三)種子須用什麼藥劑消毒，種地須用什麼藥品消毒？

【答】：(一)胡麻在本省南部播種適期為三月下旬至四月中旬。臺南改良場育成的臺南黑二號及臺南黑選出較優。可向該場接洽少量種子試作。
(二)在臺南縣的旱地須注意那些事項？病蟲害如何防治。(臺南市建國路一九一號蔡忠明)
(三)胡麻中等地，每分地施腐熟堆肥一千公斤，硫酸銨十五公斤，過磷酸鈣十五公斤，氯化鉀十公斤。

宿根蔗田可間作大豆花生

【問】：高雄地區約在農曆元月十五左右，甘蔗再留宿根地，有何適當而早熟之作物可間作？(高雄市楠梓區中場里建橋橫路十號陳松)

【答】：高雄區農曆元月中旬留宿根之蔗田，可間作大豆、花生或花螺豆等，大豆以臺大高雄五號，花生以臺農一號等早熟品種為宜，宿根蔗田間作其他作物，多因宿根蔗生長迅速，所以間作物必須甘蔗宿根處理後，立即下種才能獲得良好之收成。(胡達漢)


種植白木耳木柴 相思樹楠木最好

【問】：(一)種植白木耳(銀耳)之種植如何培養？
(二)如不能培養，何處有供應種菌？

【答】：(一)種植白木耳之樹木，以何種最宜？請告知種植白木耳之樹木，以何種最宜？濕度及氣候亦請告知。
(二)可否介紹有關培養種菌及種植方法之英文書籍。(三)重市民族街八十九號王文積)

【問】：(一)白木耳種植方法，是將白木耳孢子或組織，用人工純粹分離培養法，培養在馬鈴薯洋菜培養基上，然後將培養在馬鈴薯洋菜培養基上的菌絲塊，用移植針切取約四公厘大之正方形(大點亦可)，放於調製好的鋤屑瓶裝培養基上，令其菌絲生長發育，佈滿全瓶時即是市上所售之種菌。
(二)在臺北市衡陽街三三號香華書館有經售白木耳種菌。

【問】：(一)種植白木耳的樹木以相思樹及楠木為最適，濕度初期為七十%，後期為九十七%，氣候以初春及秋末種植為佳。
(二)目前沒有專書論述白木耳種菌培養方法。
(胡開仁)



柑桔外銷要經嚴格檢驗

【問】：(一)現外銷的甜橙類有那幾種。
(二)外銷柑的檢驗有何規定？(新竹縣新埔鎮大坪里一號薛錦煌)

【答】：(一)外銷用甜橙，至目前為止，仍以印子柑及雪柑為多。盧金剛、巴森、鳳梨、吉發等新品種甜橙，因栽培面積尚狹，未達外銷數量。
(二)凡有嚴重病蟲害如黑星、煤、潰瘍、瘡痂、麻點、銀皮、日燒、蒂腐、青微、綠微、介殼蟲、果實蠅等病蟲害，及粗皮、落蒂、不正形、外傷或腐害、果梗過長等均一律不准出口。(翁仁祿)

農友們！選購優良可靠的種子

蘆筍——美國美麗華盛頓五〇〇九號。現貨供應。

其他適於春夏季種植的——

長岡交配四季種甘藍、長岡交配六〇甘藍、長岡交配初秋甘藍、長岡交配陽春甘藍、坂田中早生甘藍、高農光悅甘藍、高農秀悅甘藍、長岡交配耐病五五白菜(經去年在本省各地栽培結果，發現是獨一無二完全耐病性品種，栽培極為容易，已獲得種植者的普遍歡迎。)長岡交配六十日白菜、坂田濱光白菜、武藏野寶冠一號、二號蕃茄、武藏野寶冠一號、二號蕃茄，高農福壽一〇〇號蕃茄、高農八號蕃茄等不及細載，歡迎選購，價目表函索即寄。

贈送蘆筍與瑞典蕪菁栽培法函索即寄

輸入 大三貿易有限公司
總經銷 大豐種子行

公司：高雄市七賢二路六二號
電話：二一四八八號
行址：高雄市建國三路二〇三號
電話：二二八三四號
劃撥儲金：高字四〇二七七號

高密度聚乙稀桶，不銹鋼壓力室
耐酸，耐鹼，耐熱，耐冷，永不腐蝕
永不破裂，不怕衝擊，不怕任何劇藥
白色透明，外觀美，壓力強，重量輕價格廉

本省首創！

金龍牌萬年噴霧器



主要產品

動力微粒噴霧器、噴粉兼用機、動力噴霧器(大、中、小型)
背囊型噴霧器、高壓式噴霧器、3 1/2 半自動噴霧器
掛肩式噴霧器、自動噴霧器、噴粉器

永安實業股份有限公司

本公司：臺中市東區十甲路101之1號
臺北辦事處：臺北市南昌街1段72號

電話：6538
電話：21268