南部栽培胡麻注意四點

【問】：㈠胡麻在何時下種最適，最近有何品種最好，何處有售？

㈡每分地需肥料多少？

㈢種子須用什麼藥劑消毒，種地須用什麼藥品消毒？

㈣在臺南縣的旱地須注意那些事項？病蟲害如何防治。（臺南市建國路一九一號蔡忠明）

【答】：㈠胡麻在本省南部播種適期爲三月下旬至四月中旬。臺南改良場育成的臺南黑二號及臺南黑選出較優。可向該場撥讓少量種子試作。

㈡肥將中等地，每分地施腐熟堆肥一千公斤，硫酸錏十五公斤，過磷酸鈣十五公斤，氯化鉀十公斤。

㈢種子用「賜保根」粉拌種，每十公斤種子拌五十公克（〇・五%）。土壤害蟲可用四十%阿特靈可濕性粉劑，每分地一台斤，加水二百～三百倍，平均噴施混入土中。

㈣胡麻雖耐旱性强，但土壤過乾時須酌量灌溉，即開花初期及其後約十五日灌溉二－三次可增加收量。生育期有立枯病及青枯病發生時應立即拔除，其跡地撒布木灰，斑點病應避免施用過量氮肥，白粉病可撒布可利生一千倍液防治。害蟲有蚜蟲可噴射五十%馬拉松乳劑一千至一千五百倍液，紅蜘蛛可用鐵地旺或開路生可濕性粉劑八百倍防治。（陳春齡）

宿根蔗田可間作大豆花生

【問】：高雄地區約在農曆元月十五日左右，甘蔗再留宿根地，有何適當而早熟之作物可間作？（高雄市楠梓區中場里建楠橫路十號陳松）

【答】：高雄區農曆元月中旬留宿根之蔗田，可間作大豆、花生或花螺豆等，大豆以臺大高雄五號，花生以臺農一號等早熟品種爲宜，宿根蔗田間作其他作物，多因宿根蔗生長迅速，所以間作物必須甘蔗宿根處理後，立即下種才能獲得良好之收成。（胡達漢）

種植白木耳木柴

相思樹楠木最好

【問】：㈠種植白木耳（銀耳）之種菌如何培養？

㈡如不能培養，何處有供應種菌？

㈢請告知種植白木耳之樹木，以何種最宜？濕度及氣候亦請簡告。

㈣可否介紹有關培養種菌及種植方法之外文書籍。（三重市民族有街八十九號王文積）

【答】：㈠白木耳種菌培養方法，是將白木耳胞子或組織，用人工純粹分離培養法，培養在馬鈴薯淨菜培養基上，然後將培養在馬鈴薯淨菜培養基上的菌絲塊，用移植針切取約四公厘大之正方塊（大點亦可），放置於調製好的鋸屑瓶裝培養基上，令其菌絲生長發育，佈滿全瓶時即是市上所售之種菌。

㈡在臺北市衡陽街三三號香華書館有經售白木耳種菌。

㈢種植白木耳的樹木以相思樹及楠木爲最適，濕度初期爲七十%，後期爲九十%，氣候以初春及秋末種植爲佳。

㈣目前沒有專書論述白木耳種菌培養方法。（胡開仁）

柑桔外銷要經嚴格檢驗

【問】：㈠現外銷的甜橙類有那幾種。

㈡外銷柑的檢驗有何規定？（新竹縣新埔鎮大坪里一號薛錦煌）

【答】：㈠外銷用甜橙，至目前爲止，仍以印子柑及雪柑爲多。虛金剛、巴森、鳳梨、吉發等新品種甜橙，因栽培面積尚狹，未達外銷數量。

㈡凡有嚴重病蟲害如黑星、葉、潰瘍、瘡痂、痲點、銀皮、日燒、蒂腐、背黴、綠黴、介殼蟲、果實蠅等病蟲害，及粗皮、落蒂、不正形、外傷或藉害、果梗過長等均一律不准出口。（翁仁祿）

高密度聚乙稀桶，不銹鋼壓力室
耐酸，耐鹼，耐熱，耐冷，永不腐蝕
永不破裂，不怕衝擊，不怕任何劇藥
白色透明，外觀美，壓力强，重量輕價格廉
遠銷東南亞，非洲，中南美。敬請採購，歡迎經銷。

本省首創！

金龍牌萬年噴霧器

主要產品
動力微粒噴霧，噴粉兼用機
背囊型噴霧器
掛肩式噴霧器
全自動噴霧器
動力噴霧器（大、中、小型）
高壓式噴霧器
3½半自動噴霧器
噴粉器

永安實業股份有限公司
本公司：臺中市東區十甲路101之1號　電話：6538
臺北辦事處：臺北市南昌街1段72號　電話：21268

農友們！選購優良可靠的種子

蘆筍—美國美麗華盛頓五〇〇九號・現貨供應。

其他適於春夏季種植的——

長岡交配四季種甘藍、長岡交配六〇甘藍、長岡交配初秋甘藍、長岡交配陽春甘藍、坂田中早生甘藍、高農光悅甘藍、高農秀悅甘藍；長岡交配耐病五五白菜（經去年在本省各地栽培結果，發現是獨一無二完全耐病性品種，栽培極爲容易，已獲得種植者的普遍歡迎。）長岡交配六十日白菜、坂田濱光白菜；武藏野寶冠一號、二號蕃茄、武藏野夏冠一號、二號蕃茄，高農福壽一〇〇號蕃茄、高農八號蕃茄等不及細載，歡迎選購，價目表函索即寄。

贈送蘆筍與瑞典蕪菁栽培法函索即寄

輸入總銷　大三貿易有限公司
大豐種子行
公司：高雄市七賢二路六二號
電話：二一四八八號
行址：高雄市建國三路二〇三號
電話：二二八三四號
劃撥儲金：高字四〇二七七號