

### 催花鳳梨十九個月採收 臺農四號六號適合生食



【問】：(一)鳳梨定植至成熟需時多久？  
(二)那一品種較為耐旱，屏東縣何時種植最適當？  
(三)臺農四號特性怎樣？

潮州延平(卷四十號曾社修)  
(四)那一種適於生食用？

【答】：(一)鳳梨普通在八、九月間栽植，於第三年七、八月間成熟採收，約需二十二個月，但在栽植後第二年九月進行催花處理，則可在第三年三、四月間成熟採收，約需十九、二十個月。  
(二)鳳梨可謂耐旱的作物。鳳梨各品種間以狹葉及有刺之品種較為耐旱，如臺農四號、有刺黃皮、有刺紅皮、突目等品種。屏東縣栽植適期為八、九月間。

(三)臺農四號為開英種與馬立求斯之雜交後代，果徑約在十一、十二、五公分，果重約在一、〇一、二公斤，果肉淡黃白色，軟且脆，組織鬆，果汁不甚多，但極甜，約在十九度(Brix)，為生食用品種，植株葉片有刺。  
(四)臺農四號及六號，開英種之突目，砂寮等均為生食品種。(黃季春)

### 春植番茄「馬娜里」「寶冠」較好

【問】：現在栽種番茄，採用馬娜里露品種是否適合，土質半砂土。要用「番茄多旺」處理花房嗎？應注意何事請指教。(桃園縣龜山鄉龜山村過溪一鄰四號林阿木)

【答】：(一)春季播種番茄，以馬娜里或寶冠為宜，如現在開始育苗，於開花着果期無須使用「番茄多旺」處理，因溫度在攝氏二十五至十五度間，是番茄着果適溫範圍。  
(二)春植番茄因多濕的關係，特別注意排水，並經常噴射大生七八，或二十二可濕性粉劑四百倍稀釋液，每隔七至十天噴射一次，預防疫病，如有青瘡象發生，宜噴射賽文八百至一千倍液防除。(王進生)

### 荔枝宜用高壓繁殖 番石榴可用芽接法

【問】：(一)鄰舍有荔枝(三月紅)將其高壓繁殖，根部發育非常良好，但是剪下來栽培時大多數不會生長，或經半年甚或二年也全部枯死，是何原因？  
(二)荔枝是否可用芽接法或嫁接法繁殖？  
(三)番石榴是否也可以用芽接法繁殖？  
(四)那一種作砧木最為適合？如同同樹作砧木，其品質是否會變？何時接木較適合？  
(五)將番石榴(四季月拔)之種子繁殖，栽種後，一年始能結果一次，是何原因？  
(六)新竹香山鄉中隆村五十七號邱福興)

【答】：(一)壓條荔枝剪取的時期非常重要，普通在四、五月壓條的，到九月中下旬或十月上旬，即雨季終了時剪下最適宜，因這時的新根還是生活的，種在土中可以立即吸收水分，使壓條不致乾死。若經過長時期的乾燥天氣才剪下，往往有很多根早已枯死，這種壓條種在土中，便很難成活。種後半年乃至二年枯死的，應該是管理不善，與壓條苗無關。

(二)荔枝芽接非常困難，目前仍以空中壓條法最理想。壓條最適時期是四至五月。  
(三)番石榴可以用補貼芽接法繁殖，各品種的實生苗，應該都可用作砧木。品質不會變，五至十月最適適合番石榴芽接。  
(四)實生苗常有變異，不能完全保持親本的原有特性，所以四季月拔的實生種，不一定是四季結果。(張振岳)

### 椰子採收期因目的不同而異

【問】：(一)如何鑑別椰子採收適期？  
(二)如何鑑別採下的椰子是否會發芽？  
(三)如何培植椰子使其發芽？(高雄縣旗山南勝里南新路五十號李昆庸)

【答】：(一)、(二)椰子果核的內壁附生一層白色物質叫椰仁，隨果實的發育逐漸增厚。椰仁內部是一空腔，充滿甜味的液體。果實愈接近成熟，空腔內的液體愈減少。採取

# 農藥牌方圓

- 克滅松乳劑
- 萬能松乳劑
- 稻特松乳劑
- 米農乳劑



其他各種農藥及允多收，美綠元，愛果麗等。


## 允發農化工廠有限公司

台北市西園路二段167號 TEL.36549

## 裕隆牌

# 陸用柴油引擎

DE-6A型 7.5馬力 NT\$13,860.00



另有DE-4型5馬力柴油引擎  
均參加合作金庫實物貸款  
請逕洽各地農會

## 裕隆汽車製造股份有限公司

臺北市信陽街十六號

◀備有說明書函索當即寄奉▶