

椰子以何時最適宜，要看採收的目的而定。

如果是以取食果汁為目的，在果實已充分大時，便可採收，這樣可以取食最多的果汁。如以取食椰仁為目的，便需待果汁減少到最少量，而椰仁增大到最厚時採收。椰仁增到最厚的時候，也是胚體充分發育的時候，這種果實才有發芽的可能。充分成熟的果實，果殼是呈褐色。此外搖動果實，聽裏面果汁的響聲，可以判斷果汁的多少，也是決定成熟度的方法。

(2)首先掘一直徑約二呎的播種穴。用堆肥混合好土壤填充穴內。然後將椰子果實平臥放入，果實的最上部約與地面齊平。覆土的高度也以此為標準。然後在它的週圍用土培高，作成盆形，以便灌水。上面並需加蓋草類，經常維持濕潤便可。(張振南)

### 「十姐妹」「烏唇」 鳥雌雄鑑別法

(1)美國「金絲鳥」之雌雄鑑別法如何？

(2)發育正常之十姐妹，出生後約幾個月，方可再生第二代？

(3)鵝唇鳥須在何種環境下，方可產生第二代？(指鳥籠言)鳥籠是否須要寬敞？(社頭鄉廣興村圳仔巷二號蕭濟敏)

(答)：(1)十姐妹離鳥在外觀上從顏色、肛門、嘴及體型大小等都無法判定，且公母鳴聲亦同，故須待孵化後二至三個月聽其鳴聲來判別，即雄鳥發出「筆！筆！」的高音，雌鳥發出「的拉！的拉！」的短低音。「鳥唇鳥」雄鳥下嘴黑色者為雄鳥，下嘴脣有白點為雌鳥。

(3)凡臺灣省飼鳥協會會員，即享有貨放金絲雀資格。

(三)三個月左右可再生。

(四)飼十姐妹鳥籠即可。(邱見堂)

(五)聯欣

### 鷄糞粘結肛門

#### 試用消炎片治療

(1)我所養的小鷄肛門有糞塊粘着，來糞便仍不改變，請問是何病？如何治療？(2)養鷄用那一種飼料較好？(臺中市民族路四號周劉美榮)

(答)：(1)所問小鷄肛門有糞塊粘着，但未知糞便的顏色，及有無其他徵狀，故無法確實答覆。該糞便如為白色則可能為雞白痢，無藥可以治療，宜早日淘汰。該糞便如為其他顏色而飲食仍能正常，則可能為一般的消化道疾病而引起的鴉痢，稀糞粘着在肛門周圍，乾後結成糞塊，亦可能為慢性鶲球蟲病而引起。此種病徵可試用消炎片治療，可能有效，同時肛門附近粘着的糞塊，應小心除去。

(2)養鷄飼料可在市場買回各種原味飼料，根據鷄隻大小需要，自行配合，或直接購買配合飼料也可，但應根據鷄隻大小選購。(李培元)

### 「桃園」「雙溪」豬種 外觀體形的鑑別方法

(問)：(1)請問桃園種與雙溪種有什麼區別？如何看法？

(2)桃園種母豬交配盤克夏公豬的一代雜種，體形如何看法，請將頭部及身體部明細指示。(彰化縣福興鄉萬里村三號陳有堂)

(答)：(1)桃園種和雙溪種都是在來種地方如下：(1)桃園種之耳朵比雙溪種小型，(2)桃園種之背部沒有雙溪種凹的皺紋，(3)桃園種頭部及身體之皺紋少。雙溪種和盤克夏之一代雜種皺紋是會遺傳出來，桃園種就不

## 適合多種作物，增加收量二成以上

### 化學合成肥料

# 五谷牌

△五谷肥：含有氮21%、鉀3%及植物生長要素多種，使葉莖強韌，促進生長，發育健全，不易倒伏，適用水稻、鳳梨、香蕉、竹筍、雜糧等。(可以混合磷鉀銨使用)

△磷鉀銨：水溶性的有機質肥料，容易被植物吸收，增強病蟲害抵抗力，提高品質及產量，適用豆類、瓜類、蘆筍、蔬菜、什糧等。

△青果肥：含有氮10%、磷3%、鉀3%、矽、鎂、鈣、鐵、錳等之綜合最新有機質肥料，改良土壤特有卓越效果，無需再施用任何他種肥料，最適合柑桔、香蕉、鳳梨、西瓜、蘆筍、蔬菜等其他作物。

台灣省檢驗局檢驗合格  
台製字第10002號



健興肥料股份有限公司  
三重市大有街26~1號 電話：97-2791