




格 價

角二元五十四・冊大二套全

(內在費郵號掛括包)

買 購

請到
附近郵局
，利用郵
政劃撥五
九三〇號
豐年社帳
戶匯錢即
可。

附啓：「臺灣雜糧作物品種圖說」農業要覽「漁業」輯和「獸醫」輯等書已全部賣完，請不要再匯錢來，以免損失匯費！

豐年讀者服務部代售

農林廳編印・農復會補助

農業要覽「糧食作物」輯

上項肥料，每年分兩次施用，第一次於春季三月間施用全年用量的半，第二次於秋季九月施用其餘的一半。行條狀施肥法，第一次施於植株前後兩方，第二次施於植株左右兩方。第一年植株較小，施用上述肥料量的二分之一即可。

印度在木省南部開花結果適值旱季，雨量不足，需要灌溉，宜每半個月灌水一次，否則產量品質都會受影響。

開花期產量高

印度開花期很長，自五月至十一月都有，以九、十月開花最多，結果也最爲確實。成熟期自一月至四月。未熟果綠色，味澀，成熟果黃綠色或淡褐色，無澀味甜脆微酸，所以在成熟後採收品質最好。過熟變黃色，肉質綿軟，品質不好，也不耐運輸貯藏。

由於開花期長，所以成熟期也長，應每隔二、三日採收一次，採收後裝於籃內或塑膠袋內立即送往市場販賣，包裝運輸時應注意勿將果實壓傷，撞傷或擦傷。

常見害蟲有三種

印度病害很少，常見蟲害有下列三種：

- (1) 大避債蛾：幼蟲棲息於果囊內，爲害新梢嫩葉和幼果。防治法有二：一爲摘除果囊加以捕殺；二爲用五十%賽文可濕性粉劑加水三百倍噴佈或用二十五%滴滴涕乳劑加水五百倍噴佈。
- (2) 節角捲葉蟲：幼蟲將新芽的數個葉片綴結在一起而藏於其中，食害葉片。防治法，用五十%賽文可濕性粉劑加水五百倍噴佈。
- (3) 毒蛾類：成蟲晝伏夜出，產卵於葉背面，幼蟲食害新梢嫩葉花穗和幼果。防治法同(2)。

缺水土地・宜種雜糧

近來，正值中北部稻作插秧時期，因爲久久沒有下雨，灌溉水量不足，許多稻田因而不能及時插秧。奉勸各位農友，如果真的水量不足，請適時改種需水較少的雜糧，也可以得到最高的生產。

雜糧作物的品種，近年也有很輝煌的改進成就。如大豆、花生、甘藷等，都有許多很好的新品種推廣。又如玉米和高粱兩種作物，過去種植面積都不大，近年產量特豐的雜交品種次第出現，使這兩種作物的生產，大爲有利，很值得農友們注意。雜交種子因爲有它雜種優勢的關係，生勢特別強健，產量特別高。例如普通在來種玉米，每公頃產量約在二千公斤到三千公斤，但雜交玉米臺南五號，每公頃產量約在五萬五千公上下，有時可能高達六萬或七萬公斤，比普通品種高出一倍以上。又如高粱威士品種，過去平均每公頃約在二千公斤上下，現在新出的雜交高粱臺中一號和臺中二三號，在同樣的生產條件下，每公頃產量可達五萬公斤，超過原品種一倍以上，成績實在可觀。

雜糧作物並不是完全不需灌溉，只是所需水分比種水稻要少得多，僅在發芽和開花結實時各有一、二次灌溉就可以了。因此，在水量不足地方，與其勉強栽培水稻，還不如盡量好好利用這少量的水源，去栽培需水較少的雜糧，在純經濟收益上講，是要有利得多。雜交玉米和雜交高粱種子，現在都由農林廳種苗繁殖場生產，農友們如要栽種，可向該場洽購種子。(蕭世民)

