

治防樣怎

蟲殼介粉和蟲鼻象莖蕉香

悟信



莖象鼻蟲和粉介殼蟲，是本省香蕉

的兩大害蟲。到去年爲止，植物保護推廣方法都把這兩種害蟲的防治方法分別列出，但因實際上，這兩種蟲害需要同時防治，所以，今年的植物保護推廣會議，已把這兩條規定合併，並把施藥時期提早。又根據鳳山熱帶園藝試驗分所連年試驗結果，「大利農」和「速滅松」兩種藥劑防治效果最好，所以又加列「速滅松」和「大利農」同時推廣。中興大學農學院多年來應用「蕉特靈」防治香蕉莖內莖象鼻蟲幼蟲，效果也很好，原列參考資料，今年也正式列爲推廣。經修訂後的香蕉莖象鼻蟲和粉介殼蟲的防治方法如下：

甲、目標：象鼻蟲粉介殼蟲與田蟻之聯合防治

(一)第一次施藥九月

(1)施藥前必須徹底清園。

(2)以五〇%「地特靈」可濕性粉劑七百倍稀釋液，用噴霧器噴撒於香蕉莖上，自根部噴至最高葉鞘部，以防治莖象鼻蟲，已結蕉果者，蕉果及果柄部份不能噴藥。

(3)隨即以六〇%「大利農」乳劑一千二百倍稀釋液，或五〇%「速滅松」乳劑一千倍稀釋液用噴霧器噴於香蕉之假莖上，自根部噴至最低葉鞘部，以防治粉介殼蟲。

(4)並以四十%「阿特靈」可濕性粉劑二百五十倍稀釋液噴撒於蕉株根部四週一公尺地面上以防田蟻。

(二)第二次十一月

施藥方法與甲第一次施藥(1)(2)(3)

(4)各項步驟同，如遇象鼻蟲幼蟲已侵入假莖時，以「蕉特靈」乳劑一千倍稀釋液，每株注射一百七十至二百

公撮(西四)。
乙、目標：專事防治粉介殼蟲及共棲田蟻。
(一)第三次施藥與甲(一)第一次施藥(1)(2)



蟲鼻象莖

世界著名 瑞士山德士農藥廠出品原封農藥



EKATOX B 50

500cc瓶裝

1,000cc瓶裝

農林廳登記
農藥字第 420 號

愛克司 B50

為特效滲透性，含甲基
把拉松50%之特製淡綠
色乳劑，具有安定性。

比一般把拉松效果好，對人畜毒性低。

能消滅：

水稻、棉花、柑桔、大豆、茶樹、咖啡、煙
草、龍眼、香蕉、鳳梨、木瓜、葡萄、荔枝、
瓜類、豆類、蔬菜類等數百種害蟲。
爲水稻二化三化螟蟲，之剋星！

說明書
函索即寄

進口原裝現貨供應

泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路二段108號 電話：44994

瑞士山德士農藥廠

駐臺代表處臺北郵箱878號




(3) (4) 各項步驟同 (不施 (2) 項「地特靈」)。

(二) 第四次施藥 (時期以蕉果採摘期推算) 應隨時巡視蕉園，凡發現已經孕穗而花苞尚未開裂之蕉株，不論何時應加噴六十分之一「大利農」乳劑一千二百倍稀釋液，或五十分之一「速滅松」乳劑一千倍稀釋液，以噴霧器噴撒於香蕉假莖上，自根部噴至最低葉之葉鞘部，以及未開裂之花苞上，以防粉介殼蟲侵入。

但是香蕉粉介殼蟲，除按上述聯防方法噴射六十分之一「大利農」乳劑一千二百倍或五十分之一「速滅松」乳劑一千倍稀釋液防治外，又可利用下列藥劑 (任選一種)：

藥劑名稱	稀釋倍數	備註
二十%富粒松乳劑	四百倍	① 用藥量與六十分之一「大利農」乳劑或五十分之一「速滅松」乳劑同。
五十%力拔山乳劑	一千倍	② 上項藥劑如國外市場提出異議時，應停止使用。
四十四%乃可乳劑	八百八十倍	供應出口之蕉園應停止使用。
八十五%賽文可濕粉	八百五十倍	

速滅松」效果最佳，「賽文」、「富粒松」、「乃可」、「力拔山」等殺蟲持續力較差，但其初效，都相當優異，經這次大會審查決議，列入參考資料，供農民參考。



蟲殼介粉

甚麼叫做留萌・偽莖・果手？

留萌：留萌就是留芽或留苗的意思。香蕉頭發生很多芽體，但普通種

香蕉，都是留一大株，一小株，大株收穫後，小株長大，多餘的芽體，都除掉。留芽就是在一大株旁，另留一個小的芽體，將來長成大株。

偽莖：如果把香蕉的葉片，一片

葉片包圍而成，所以叫做偽莖，又叫假莖。

果手：果手是指果實在果軸上一把一把或一段一段着生，如同人的手形；一個果軸上，可着生十一、二個果手。果手是指一個果手的一個單果而言。(王兆全)

這是今年度植物保護推廣方法新增的參考資料。因為鳳山園藝試驗所去年度受理各廠商委託試驗，以「富粒松」(Polithion)、「乃可」(Nankor)、「速滅松」辦理藥效比較試驗結果，雖以「大利農」和「

日產★農藥

日產サルトン90
殺爾頓

進口原裝 現貨供應

防治：豆類、西瓜、蔬菜等白粉病。

柑桔：銹蟬、蜘蛛、象皮病。
小麥：銹病。



製造元：日本日產化學工業株式會社
總代理：日星實業股份有限公司

現貨供應：年豐農藥行
嘉義縣義竹鄉六佳村199號 電話：義竹局24號
聯豐行
屏東市民生路194號 電話1359號

