

(1) 產道狹窄：普通產道，直徑七至十公分，長二十公分，位於仙骨、坐骨和恥骨之間。如因發育不良，過早交配，或飼養管理失當，致使多量脂肪附着於產道，使產道狹小，分娩時骨盤狹窄，就會引起難產。

(2) 陣痛微弱：因為荷爾蒙分泌不足而發生陣痛微弱。正常分娩時胎兒娩出間隔為十五至二十分鐘，三至四小時內完成分娩。因爲陣痛微弱而娩出間隔拉長，甚至停滯，或娩出一、二頭後陣痛變爲微弱，都會發生難產。

母豬難產怎麼辦？

■ ■ 在自侯 ■ ■

屏東縣長治鄉，是綜合性養豬計劃推行得最爲成功的一個地方。該鄉農友，過去每年每戶平均只養四、五頭豬，但現在一年可賣七、八十頭的農戶很多，而且多數是三品種猪。農友們爲研究養豬技術，會自動組織養豬研究班。下面是潭頭村研究班，在上（二）月五日晚上八時開會，由邱富榮農友提出問題，經縣政府侯自在先生解答的實際紀錄，可供其他養豬農友的參考。

(5) 胎兒斃死：豬的死胎，佔分娩頭數的七至一〇%，其中四分之二是黑仔（木乃伊變性）。正常的分娩，是除母豬本身的陣痛外，還要配合胎兒的運動而完成的。如在分娩前就死，胎兒斃死，就會引起難產。胎兒斃死原因有：臍帶斷開而窒息死，臍帶捲在頸部，遺傳性（帶致死因素），或母豬腹部打撲，猪鼻被粘液阻塞等。

(6) 長期在胎：猪懷胎的標準期間為一百一十四日，前後一星期分娩為正常，很少有超過一星期以上而不分娩。如果超過一星期，應請獸醫以人工分娩的方法生產。

難產的處理

- ◎藥性持久 可與各種農藥混合使用
- 調配容易 包裝密封可耐長期保存
- ◎用途甚廣 各種農作物可使用

要農作物增收請用 酵素劑 香蘭
ヨーラン

使用香蘭優點：

十天可作成完熟堆肥，腐熟促進，肥效增進，糞尿速成優良肥料，老化土地之更新，病蟲害預防，果實加甜味，蔬菜繁茂提早收成，增加產量。（說明書函索即寄）

稻	稻熱病、紋枯病、胡麻葉枯病、小粒菌核病 、白葉枯病、馬鹿苗病。
麥	赤黴病、株腐病、立枯病。
蕎	葉黴病、褐斑病、疫病。
薯	疫病。
子	褐紋病、徽疫病、輪紋病。
芋	露菌病、炭疽病、黑星病。
瓜	白斑病、露菌病、黑斑病、腐敗病。
葫	露菌病、葉枯病、黑斑病。
蘆	黑點病、炭疽病、褐紋病。
西	褐斑病、黑點病。
白	黑點病。
洋	黑斑病、潰瘍病、黑點病。
蠶	瘡痂病。
柑	黑痘病。
橘	黑痘病。
荷	黑斑病。
花	斑葉性諸病。
其	果樹蔬菜各種病害。
卉	製造元
他	日本サンケイ(鹿兒島)化學工業株式會社 總代理:臺灣農產企業股份有限公司 中南部 彰化縣員林鎮民權街28號 電話113號 北 部 臺北市迪化街一段86號 電話:44253・42365 臺灣農業資材股份有限公司 (其他全省各大農藥行種子店均有出售)
現貨供應	