



# 農業信箱

## 大雅鄉缺水區種稻 宜選抗旱抗病品種

【問】：(一)大雅地區一、二期水稻，用何種才適合。

【答】：今年此地區，多栽植嘉南八號，此種是怎樣施肥？(臺中縣大雅鄉上楓村民生路五十九號賴德水)

【答】：大雅鄉為缺水地區，第一期作以選植抗旱及抗病之品種，如臺中在來一號，嘉農二四二號等為宜。第二期作以臺中一七八號或臺南一號較妥。

【答】：嘉南八號是一種中間型之隱定品種，肥肥當照一般蓬萊稻種行之。氮磷鉀每公頃施用一百：五十：五十比率，磷之全量，鉀之三分之二及氮之三分之一為基肥，在第一次及第二次除草時，再用餘下之氮肥各半並於第三次除草前施用其餘之鉀肥。(林克明)

## 雜交玉米糊仔栽培 比水稻更作更有利

【問】：臺南五號玉米每株幾穗，產量如何，如何施肥？需各種肥料多少，雄花抽穗後是否尚需施肥，是否適合本地區二期水稻製作，其經濟利益如何？生長後期是否需剪除部份。(彰化縣溪湖鎮媽厝里溝底路七十號王義修)

【答】：(一)雜交玉米臺南五號，行株距六十×三十公分者，每株只有壹穗，行株距較寬者最多有二穗。

(二)每十公畝產量乾燥子粒，平均四百五十至六百公斤，據試驗行株距六十×三十公分，每十公畝五千五百五十五株最合適。

(三)每十公畝施肥量，堆肥一千二百公斤，硫銨三十五—五十五公斤，過磷酸鈣二十一—三十五公斤，氯化鉀八—十公斤。

(四)玉米對堆肥及人糞之肥效特高，故施用宜多，堆肥應於播種前耕入土中，硫銨之半量及過磷酸鈣與氯化鉀之全量為基肥，播種前撒於種溝，以腳蹠覆一層薄土後播種。除硫銨之半量做為追肥，追肥時期應於雄花抽穗前十天，即雌穗分化期施於根際，勿落於葉上以免燒葉，後以牛犁行輕度培土。

(五)雄花抽穗後不要再施肥。

(六)什交玉米除極端砂土以外，任何土壤均可栽培，就中以表土深厚，富有機質，排水良好，不過分乾濕之肥沃壤土最佳，本省氣候限制不嚴均可種植。

(七)各項作物均有適合種植期，玉米分春、秋兩季，中南部卷一月下旬至二月下旬，秋八月至十月中旬，最為適合。水稻製作種植玉米生育期間較長，約一百四十一—一百五十八天，影響後期作物(水稻、花生、大豆)。產量四千公斤左右，如改用糊仔法，利用水稻收穫前二星期，玉米糊在稻溝二行三行之順序糊玉米一行，產量比水稻製作高，生育期提早，十月中旬以前糊者約一百二十五天就可收穫，不影響後作。

(八)拔除雄花穗目的，是在拔除有玉米螟虫孔之穗，並即燒却或埋沒，可減少螟害，但不可集中一處或不超過全圖二分之一，無發生者不必拔除。(王清德)

## 單輪農耕機適合田間管理

【問】：這次農業展覽會，使我增進不少農業知識，尤其對農業機械，故請問目前進口之單輪耕機性能如何，比耕牛實用否？是否能代替牛工作。(臺南縣將軍鄉答保村九二號何煥堂)

【答】：最近從外國進口之單輪耕機，僅適用於田間管理，如中耕、除草、培土等工作，因引擎馬力不大，無法代替耕牛做整地工作。(黃文源)



請認明拜耳  
商標為品質  
高超之標記



現貨供應  
興農化工股份有限公司

地址：臺中縣大里鄉內新路50號

電話：5087-5088-5089

臺北連絡處：臺北市紀興北街31巷26號

電話：98826

請用

臺灣總代理

中德貿易有限公司

地址：臺北市博愛路九十八號

電話：三三一五八  
三三一五九  
三三一五七

# 樂農家

幫助你

# 農作物 大豐收



「思登F三十四」  
可治稻田雜草

【問】：水稻或秧田，種子及什草的防治藥劑，據報紙說臺中區農業改良場，已試驗成功，請告知其藥劑名稱及使用方法，何處有售？（臺中縣龍井鄉龍東村三九號陳賦修）

【答】：秧田及本田之種子及什草防治藥劑，目前在市場可買到的者僅有一種，叫做「思登F三十四」。其藥劑可向臺中縣龍井鄉正峯農藥公司買到。至其使用方法如下：在秧田或本田播種或插秧後，待什草生長至第一—三葉時將「思登F三十四」每分地以二百克，混合于六十公斤水中，均勻撒布田面，經施用後三天再噴一次即可。以後無需要再做人工除草工作，可謂廉價而省工之除草方法。尤其對稗草之防除最有功效。但使用時，應留意三點，才能獲得好的結果：  
（一）噴「思登F三十四」時，應先排乾水（或田）水後才可噴藥，且應于噴藥後一天後始可灌水。  
（二）「思登F三十四」不可與有機磷劑或賽文等混合使用，故噴藥前應洗淨噴霧器，噴後經十五—二十天始可噴前述兩類藥劑，如想使用BHC，亦需要噴藥後一星期始可施用。  
（三）缺水地帶，不能人工除草之區域，當可用「思登F三十四」做為除草之用，但必須把握噴藥之時期及排乾水後才有效果。（林克明）

秋冬蕉的留芽與種植適期

【問】：要栽種秋冬蕉，應留何時出土的芽？何時栽種為宜？（屏東縣佳冬鄉石光村頂巷七號胡平儀）

【答】：秋蕉需要留九、十月出土的芽，十、十一月栽植，冬蕉需留十一、十二月出土的芽，二、三月栽植為宜。（王兆全）

生育期間蘆筍  
不必限制分蘖

【問】：（一）在河川砂地，表土深一公尺，底土為小石子，應開多深的溝，種植蘆筍比較適當，基肥施在何處？  
（二）生活後陸續分蘖，要如何處理，要拔掉或任其分蘖？  
（三）中等地方之砂土，每一分地肥料要多少，三要素如何配合，如何施用？（彰化縣芬園鄉嘉興村護岸街八號吳坤元）


【答】：（一）蘆筍栽培法請參閱農林廳編印的蘆筍手冊為宜。栽植溝（基肥溝）的深度約廿—廿四分，砂礫地須多施腐熟堆肥，以改良土壤的理化性質，提高土壤的保水力及地力。  
（二）蘆筍生育期間無須限制分蘖，分蘖愈多愈好，應好好培養地下莖及鱗芽為上策。  
（三）十公畝肥料之施用量各地均有不同，過磷酸鈣四十五—六十公斤，尿素六十三—七十八公斤，氯化鉀四十五—四十八公斤，應按蘆筍之生育情形斟酌施用。（王進生）

綠竹每年施肥一、二次  
尿素和人糞尿是好肥料

【問】：（一）聽說綠竹施硫酸銨會開花是否確實？  
（二）綠竹追肥可施尿素嗎？  
（三）人糞尿、尿素和硫酸銨那一種最適合？  
（四）綠竹的施肥方法如何？  
（五）今年二月種綠竹，明年可採收嗎？  
（六）苗栗頭份蘆竹里二十二號之一劉南江）

【答】：（一）綠竹施硫酸銨不會引起開花。  
（二）尿素為綠竹的良好追肥肥料。  
（三）人糞尿及尿素較適宜。  
（四）綠竹施肥法：三至四月上旬為北部施肥期，追肥一至二次。第一次於培土時，或培土前二至三天施用，施肥量每株堆肥八公斤，人糞尿六十公斤，過磷酸鈣一·五公斤。第二次施尿素〇·五公斤。  
（五）今年二月種植的綠竹，如管理良好，明年可以採收。（王進生）


禽聖片 A.C.M 禽的救星



專治：雞、火雞、鴨、鵝等傳染性炎、小鳥等傳染性炎、呼吸器病、球蟲病、家禽傷寒、球蟲病、傳染性下痢、慢性肺炎、傳染性管炎、消化不良、症。  
包裝：每小包14片裝，每盒50包裝，500片裝，2000片裝。  
（農畜衛可字第0336號）

最佳的獸藥 綜合素 Antimycin

專治特效：豬肺疫、豬丹毒、傳染性腸炎、下痢、注射反應及其他細菌性化膿性諸疾患。



用法：筋肉注射用。  
包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶裝（農畜衛可字第0338號）

製造元：太平洋製藥有限公司  
總經銷：南輝企業公司  
臺北市太原路79巷40號

長岡 交配 初秋甘藍 (全天候高麗菜)

耐暑性特強，食味最好，市場價值最高最受歡迎之早穫種，發育特快，週年可以栽培之萬能甘藍。

「說明書備索」

生產：日本夕キイ種苗株式會社

總代理：茂生有限公司

臺北市南昌路二段六六號之二

全省各大種子行有售

電話：二二八〇一八五  
二二八〇六四五  
二二八〇一〇五

### 梨樹修剪方法兩種

【問】：(一)梨樹每年施幾次肥料，何時施用最適宜？  
(二)梨樹修剪是否提高結果率？  
(三)梨樹修剪法市面有無參考書。

【答】：(一)梨樹修剪法市面有無參考書。除去年以前之枝外，今年所生之新枝在目前全部剪下是否理想。  
(二)梨樹修剪法如何？請簡單指示。(彰化縣花壇鄉三春村後厝巷四十號顧明哲)  
(三)梨樹修剪法有二，一為疏刪修剪，主用於主側枝不分明之整枝樹，即一年生之側枝，僅除去其生長在主枝之上、下或過密者，次年側枝上之芽多能形成短果枝，使其盡量結果，結果後於其附近有一年生之發育枝及二年生之結果母枝者，則將此枝自基部剪除之，每年如此進行，可得均勻之產量；一為短截修剪，係適用於主側枝分明之整枝樹，即將一年生之側枝留四至六芽剪短之，使發短果枝，逐年結果，每年僅修剪短果枝中之過多短果枝。(朱長志)

### 栽培「初秋甘藍」

【問】：我想在新曆三月上旬，播種甘藍，因為現在甘藍的種類甚多，對夏季的甘藍栽培困難。據說長岡初秋甘藍，品種很好，耐熱性特強，請問那種品種適合夏季栽培，如栽培長岡初秋甘藍，新曆三月初，下種適合否？每球重量多少。(嘉義六脚鄉瑞陽村六五號蘇登煌)

【答】：初秋甘藍雖較耐熱，但三月初下種較遲，如在二月初下種三月初定植為宜，今年春季因時間來不及，故請七月中旬播種，八月中旬定植為佳，初秋甘藍每球重量一·二—二·〇公斤。(王進生)

### 二月七月中播種

【問】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【答】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

### 減少羊乳臭味

【問】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【答】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)



### 氯化鉀硫酸鉀 適用作物略異

【問】：(一)糧食局以粉狀氯化鉀配給稻農施用，臺灣公司以粒狀硫酸鉀配給蔗農施用，據所配肥料不同，假如水稻施用硫酸鉀，會有不良之後果否？  
(二)據貴刊過去說過，鉀肥容易被水流失，不能全部作基肥，應分數次追肥，然近年配給之粉狀氯化鉀，如與三要素混合施用時，水稻發生肥害，粉狀氯化鉀黏於水稻葉上，燒傷非常厲害，假如水稻能施用粒狀硫酸鉀就能減輕肥害，如不能時如何防止肥害。  
(三)該二種鉀肥之分別，到底那種鉀肥適用那種作物？(屏東縣內埔鄉豐田村新中路二五號張連鳳)

【答】：(一)糧食局及糖業公司所分配鉀肥，大部份為氯化鉀，但一部份不適用氯化鉀肥地區，如鹽分或鳳梨、菸草等作物，有分配硫酸鉀。硫酸鉀為中性，無吸濕性，施用於水稻不但助長水稻生長，改善土壤理化性，並沒有不良後果。  
(二)氯化鉀含有氯，氯在土中溶脫鉀，並阻害生育，因之一部份做基肥外，分數次與氮磷肥混合追肥，先排水後盡量靠地面施肥，同時除草不會發生肥害。如怕肥害，可混合若干量有機質肥料，可減少肥害。  
(三)硫酸鉀適用於澱粉性作物，如甘蔗、菸草、鳳梨、果樹類等。氯化鉀除一般作物均可適用外，適用於纖維作物，但不適用於鹽分地或菸草及鳳梨等作物。(吳石生)

### 清潔羊舍羊身

【問】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【答】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【問】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【答】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【問】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【答】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【問】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【答】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【問】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

【答】：我種一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？(雲林縣褒忠鄉中正路九三號王慶國)

# 農藥牌方圓

萬特松 乳劑  
最新低毒性

萬能松 乳劑

稻特松 乳劑

米 農 乳劑  
水 銀 乳 劑

其他各種農藥及允多收，美綠元，愛果麗等。

## 允發農化工廠有限公司

台北市西園路二段167號 TEL.36549

# 福利來

Furella

「フレラ」



新貨已到 即請購用

育雛好消息!!

## 八折大優待

鷄白痢的特效藥「福利來」為供應新雛育成的成功特別實行八折大優待。每罐一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。

「說明書備索」

總代理：英商卜內門洋碱有限公司  
臺北市中正路一八〇〇號  
經銷處：國際藥房  
臺北市長安東路一段三九號

各地 飼料行 均售

# 病熱稻種萊蓬

請用



日本三共株式會社出品

# リオゲン



## 元農利

包裝 500g 入

包裝 100g 入

製造元：三共株式會社

進口：招德貿易股份有限公司

【答】：羊乳消毒，不用加什麼藥品或香料，製奶粉是不可能的事，因為你沒有這種設備，在外國來講，目前還沒有羊奶粉，因羊乳的本身產量不多，還是吃鮮乳的好。至于羊乳的味道不佳，這是一種習慣，吃慣了自然不覺得有何不好的味道，但是你的羊舍要清潔，母羊身體也要經常保持清潔，最好不要和公羊放在一起，尤其是擠乳期。羊乳消毒最簡單的方法，是用紗布過濾，然後用小鍋煮，或是蒸均可，不可蒸煮太久。（黃立羣）

### 銀猪次數數量

#### 根據猪隻大小決定

【問】：（一）猪隻各期每隻應喂食多少乾飼料，如何控制才不致過食以符經濟。每天分幾次喂飼才理想。

（二）甘藷或甘藷蔓等青料，生食與熟食何種為優？營養與衛生兩者兼顧而言，有什麼方法（甘藷是施猪肥）。

（三）青飼料應在何時喂食，喂食乾料前後或中間，每天青飼料多少？

（四）大中小猪每日飲水多少？  
（五）水質鐵份過多，如何補救？  
（六）中午不喂，改夜晚十一點飼食是可行。  
（臺北汐止鎮茄冬里七二號唐榮福）

【答】：（一）猪隻飼餵次數，以猪之大小而應有分別，小猪讓其任吃或分五、六次，中猪四、五次，大猪三次，每次之量在三十至一小時內吃完為止，才不致過食，大約小猪一、一·五公斤，中猪一·五、二公斤，大猪二至三公升。

（二）依消化與衛生上來說，熟食較好，但消耗燃料及勞力，青料不宜過煮，因會損失維生素。若要避免病蟲感染，青料不要施猪糞尿。

（三）青飼料給與時間，以間食為宜，每天約半公斤就夠。

（四）飲水量不要限制任其飲食。  
（五）水質鐵份過多，應設噴水或滴水設備使水中鐵份氧化後過濾。

（六）如能如此做，對猪隻之採食消化增重等更有利。（張聯欣）

## 農友大福音

◎適合春夏栽培蔬菜品種，由二代七十餘年之種子專家親自改良特選品種，信用最可靠供應國內外農友可安心栽培，希勿失良機，敬請賜顧選購。


1. 早春35天結球白菜 (下種期：農曆元月下旬至二月下旬)
2. 鳳山短種50天蘿蔔(菜頭) (下種期：農曆元月上旬至十月下旬)
3. 頭州早長種50天蘿蔔 (下種期：農曆二月上旬至十月下旬)
4. 青粉葉30天結球白菜 (下種期：農曆三月上旬至七月下旬)
5. 新夏秋35天結球白菜 (下種期：農曆三月上旬至八月下旬)
6. 坂田一代交配中早生甘藍 (四季均可下種)

其他各色品種應有盡有及各種農藥、肥料等詳細請參閱一九六四、五年新園藝。

## 清河種子行

嘉義市中正路四八二號  
電話：三五八四號  
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號

# 藥勁特種水



大京元化學工業股份有限公司

公司：臺中市西區三民路一段97號  
工廠：臺中縣大里鄉塗城村92號