

農業信箱



大雅鄉缺水區種稻 宜選抗旱抗病品種

【問】：(大雅地區一、二期水稻，用何種才適合？)

(今年此地區，多栽植嘉南八號，此種是怎樣施肥？(臺中縣大雅鄉上楓村民生路五十九號賴德水))

(答)：大雅鄉為缺水地區，第一期作以選植抗旱及抗病之品種，如臺中在來號，嘉農二四二號等為宜。第二期作以臺中一七八號或臺南一號較妥。

(答)：臺南八號是一種中間型之隱定品種，配肥當照一般蓬萊稻種行之。氮磷鉀每公頃施用一百：五十：五十比率，磷之全量，鉀之三分之二及氮之三分之一為基肥，在第一次及第二次除草時，再用餘下之氮肥各半並於第三次除草前施用其餘之鉀肥。(林克明)

雜交玉米糊仔栽培

比水稻裏作更有利

【問】：臺南五號玉米每株幾穗，產量如何，如何施肥？需各種肥料多少，雄花抽穗後是否尚需施肥，是否適合本地區二期水稻裏作，其經濟利益如何？生長後期是否需要剪掉部份。(彰化縣溪明鎮媽厝里浦底路七十號王義修)

(答)：(1) 雜交玉米臺南五號，行株距六十×三十公分者，每株只有三穗，行株距較寬者最多有二穗。

(2) 每十公畝產量乾燥子粒，平均四百五十至六百公斤，據試驗行株距六十×三十公分，每十公畝五千五百五十五株最適合。

(3) 每十公畝施肥量，堆肥一千二百公斤，硫鎳三十五—五十五公斤，過磷酸鈣二十一—三十五公斤，氯化鉀八十—一百斤。

玉米對堆肥及人糞之肥效特高，故施用量宜多，堆肥應於播種前耕入土中，硫鎳之牛量及過磷酸鈣與氯化鉀之全量為基肥，播種前撒於種溝，以腳蹴覆一層築土後播種。餘硫鎳之半量做為追肥，追肥時期應於雄花抽穗前十天，即雌穗分化期施於根際，勿落於葉上以免燒葉，後以牛犁輕度培土。

(4) 雄花抽穗後不要再施肥。

(5) 什交玉米除極端砂土外，任何土壤均可栽培，就中以表土深厚，富有機質，排水良好，不過分乾燥之肥沃壤土最佳，本省氣候限制不嚴均可種植。

(6) 各項作物均有適合種植期，玉米分春秋兩季，中南部春一月下旬至二月上旬，秋八月下旬至十月中旬，最為適合。水稻裏作種植玉米生育期間較長，約一百四十一—一百五十五天，影響後期作物(水稻、花生、大豆)。產量四千公斤左右，如改用糊仔法，利用水稻收穫前二星期，玉米糊在稻溝一行三行之順序糊玉米一行，產量比水稻裏作高，生育期提早，十月中旬以前糊者約一百二十五天就可收穫，不影響後作。

(7) 拔除雄花穗目的，是在拔除有玉米螟蟲之穗，並即燒却或埋沒，可減少螟害，但不可集中一處或不超過全圃二分之一，無發生者不必拔除。(王清德)

單輪耕耘機適合田間管理

現貨供應
興農化工股份有限公司
地址：臺中縣大里鄉內新路59號
電話：5087-5088-5089

臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號
電話：38826

臺灣總代理
中德貿易有限公司

地址：臺北市博愛路九十八號
電話：三三一五七
三三一五八
三三一五九

農作物收豐大農家



請認明拜耳
商標為品質
高超之標記



請用

幫助你