



「思登F三十四」
可治稻田雜草

【問】：水稻或秧田，種子及什草的防治藥劑，據報紙說臺中區農藥改良場，已試驗成功，請告知其藥劑名稱及使用的方法，何處有售？（臺中縣龍井鄉龍東村三九號陳賦修）

【答】：秧田及本田之種子及什草防治藥劑，目前在市場可買到的僅有一種，叫做「思登F三十四」。其藥劑可向臺中縣龍井鄉正峯農藥公司買。至其使用法如下：在秧田或本田播種或插秧後，待什草生長至第一—三葉時將「思登F三十四」每分地以二百克，混合于六十公斤水中，均勻撒布田面，經施用後三天再噴一次即可。以後無需要再做人工除草工作，可謂廉價而省工之除草方法。尤其對稗草之防除最有功效。但使用時，應留意三點，才能獲得好的結果：

- (一)噴「思登F三十四」時，應先排乾水（或田）水後才可噴藥，且應于噴藥後一天後始可灌水。
- (二)「思登F三十四」不可與有機磷劑或賽文等混合使用，故噴藥前應洗淨噴霧器，噴後經十五—二十天始可噴前述兩類藥劑，如想使用BHC，亦需要噴藥後一星期始可施用。
- (三)缺水地帶，不能人工除草之區域，當可用「思登F三十四」做為除草之用，但必須把握噴藥之時期及排乾水後才有效果。（林克明）

秋冬蕉的留芽與種植適期

【問】：要栽種秋冬蕉，應留何時出土的芽？何時栽種為宜？（屏東縣佳冬鄉石光村頂巷七號胡平儀）

【答】：秋蕉需要留九、十月出土的芽，十、十一月栽植，冬蕉需留十一、十二月出土的芽，二、三月栽植為宜。（王兆全）

生育期間蘆筍
不必限制分蘖

【問】：（一）在河川砂地，表土深一公尺，底土為小石仔，應開多深的溝，種植蘆筍比較適當，基肥施在何處？

（二）生活後陸續分蘖，要如何處理，要拔掉或任其分蘖？

（三）中等地方之砂土，每一分地肥料要多少，三要素如何配合，如何施用？（彰化縣芬園鄉嘉興村護岸街八號吳坤元）

【答】：（一）蘆筍栽培法請參閱農林廳編印的蘆筍手冊為宜。栽植溝（基肥溝）的深度約廿—廿四分，砂礫地須多施腐熟堆肥，以改良土壤的理化性質，提高土壤的保水力及地力。

（二）蘆筍生育期間無須限制分蘖，分蘖愈多愈好，應好好培養地下莖及鱗芽為上策。

（三）十公畝肥料之施用量各地均有不同，過磷酸鈣四十五—六十公斤，尿素六十三—七十八公斤，氯化鉀四十五—四十八公斤，應按蘆筍之生育情形斟酌施用。（王進生）

綠竹每年施肥一、二次
尿素和人糞尿是好肥料

【問】：（一）聽說綠竹施硫酸銨會開花是否確實？

（二）綠竹追肥可施尿素嗎？

（三）人糞尿、尿素和硫酸銨那一種最適合？

（四）綠竹的施肥方法如何？

（五）今年二月種綠竹，明年可採收嗎？

（六）苗栗頭份蘆竹里二十二號之一劉南江）

【答】：（一）綠竹施硫酸銨不會引起開花。


（二）尿素為綠竹的良好追肥肥料。

（三）人糞尿及尿素較適宜。

（四）綠竹施肥法：三至四月上旬為北部施肥期，追肥一至二次。第一次於培土時，或培土前二至三天施用，施肥量每株堆肥八公斤，人糞尿六十公斤，過磷酸鈣一·五公斤。第二次施尿素〇·五公斤。

（五）今年二月種植的綠竹，如管理良好，明年可以採收。（王進生）

禽聖片 A.C.M 禽的救星




專治：雞、火雞、鴨、鵝等傳染性炎、小鳥等傳染性炎、呼吸器病、球蟲病、家禽傷寒、球蟲病、傳染性下痢、慢性肺炎、傳染性管炎、消化不良、症。

包裝：每小包14片裝，每盒50包裝，500片裝，2000片裝。

（農畜衛可字第0336號）

最佳的獸藥
綜合素 Antimycin

專治特效：
豬肺疫、豬丹毒、傳染性腸炎、下痢、注射反應及其他細菌性化膿性諸疾患。



用法：筋肉注射用。
包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶裝（農畜衛可字第0338號）

製造元：太平洋製藥有限公司
總經銷：南輝企業公司
臺北市太原路79巷40號

長岡交配
初秋甘藍
（全天候高麗菜）

耐暑性特強，食味最好，市場價值最高最受歡迎之早穫種，發育特快，週年可以栽培之萬能甘藍。

「說明書備索」

生產：日本夕キイ種苗株式會社
總代理：茂生有限公司

全省各大種子行有售。
電話：二一〇八二五
臺北市南昌路二段六六號之二