梨樹修剪方法兩種

【問】：㈠梨樹每年施幾次肥料，何時施用最適當。

㈡梨樹剪定是否提高結果率？

㈢剪定法市面有無參考書。

㈣除去年以前之枝外，今年所生之新枝在目前全部剪下是否理想。

㈤梨修剪法如何？請簡單指示。（彰化縣花壇鄉三春村後厝巷四十號顧明哲）

【答】：㈠竹東大梨，年可施肥二次，第一次在一月下旬，第二次在十月下旬。

㈡梨樹剪定有抑制枝稍生長作用，並能調節結果，使每年有均勻之產量。

㈢梨之剪定法，尚無詳細之中文書籍，但在市面上可買到日文書籍。

㈣今年新枝不能全部剪去，可除去其過密者，因明年此新枝上即可生短果枝。

㈤梨之修剪法有二，一為疏刪修剪，主用於主側枝不分明之整枝樹，即一年生之側枝，僅除去其生長在主枝之上面、下面或過密者，次年側枝上之芽多能形成短果枝，使其盡量結果，結果後於其附近有一年生之發育枝及二年生之結果母枝者，則將此枝自基部剪除之，每年如此進行，可得均勻之產量；一為短截修剪，係適用於主側枝分明之整枝樹，即將一年生之側枝留四至六芽剪短之，使發短果枝，逐年結果，每年僅修剪短果枝羣中之過多短果枝。（朱長志）

栽培「初秋甘藍」
二月初七月中播種

【問】：我想在新曆三月上旬，播種甘藍，因為現在甘藍的種類甚多，對夏季的甘藍栽培困難。據說長岡初秋的甘藍，品種很好，耐熱性特強，請問那種品種適合夏季栽培，如栽培長岡初秋甘藍，新曆三月初，下種適合否？每球重量多少。（嘉義六脚鄉崙陽村六五號蘇登煌）

【答】：初秋甘藍雖較耐熱，但三月初下種較遲，如在二月初下種三月初定植為宜，今年春季因時間來不及，故請七月中旬播種，八月中旬定植為佳，初秋甘藍每球重量一・二—二・〇公斤。（王進生）

氯化鉀硫酸鉀
適用作物略異

【問】：㈠糧食局以粉狀氯化鉀配給稻農施用，臺糖公司以粒狀硫酸鉀配給蔗農施用，據所配鉀肥不同，假如水稻施用硫酸鉀，會有不良之後果否？

㈡據貫刊過去說過，鉀肥容易被水流失，不能全部作基肥，應分數次追肥，然近年配給之粉狀氯化鉀，如與三要素混合施用時，水稻發生肥害，粉狀氯化鉀黏於水稻葉上，燒傷非常厲害，假如水稻能施用粒狀硫酸鉀就能減輕肥害，如不能時如何防止肥害。

㈢該二種鉀肥之分別，到底那種鉀肥適用那種作物？（屏東縣內埔鄉豐田村新中路二五號張連鳳）

【答】：㈠糧食局及臺糖公司所分配鉀肥，大部份為氯化鉀，但一部份不適用氯化鉀地區，如鹽分地或鳳梨、菸草等作物，有分配硫酸鉀。硫酸鉀為中性，無吸濕性，施用於水稻不但助長水稻生長，改善土壤理化性，並沒有不良後果。

㈡氯化鉀含有氯，氯在土中溶脫鈣，並阻害生育，因之一部份做基肥外，分數次與氮磷肥混合追肥，先排水後盡量靠地面施肥，同時除草不會發生肥害。如怕肥害，可混合若干量有機質肥料，可減少肥害。

㈢硫酸鉀適用於澱粉性作物，如甘蔗、菸草、鳳梨、果樹類等。氯化鉀除一般作物均可適用外，適用於纖維作物，但不適用於鹽分地或菸草及鳳梨等作物。（吳石生）

清潔羊舍羊身
減少羊乳臭味

【問】：我養一隻乳羊，每晨羊乳加工是單用煮沸法，風味不好，羊臭味太濃，不知羊乳加工需經過何種過程，方能消除臭味？尚需加何種藥品或香料？可否製成羊奶粉？（雲林縣麥忠鄉中正路九三號王慶國）

圓方牌農藥

萬特松乳劑
最新低毒性

萬能松乳劑

稻特松乳劑

米農乳劑
水銀乳劑

圓方牌

其他各種農藥及允多收，
美綠元，愛果麗等。

允發農化工廠有限公司
台北市西園路二段167號 TEL.36549

享譽已久
公認的效力

福利來

Furella
'フレラ'

新貨已到
即請購用

育雛好消息!!

八折大優待

鷄白痢的特效藥「福利來」為供應新雛育成的成功特別實行八折大優待。每雛一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。

「說明書備索」

總代理：英商卜內門洋碱有限公司
臺北市中正路一八〇〇號

總銷處：國際家畜藥物廠
臺北市長安東路一段三九號

各地飼料行大藥房均售