

病熱稻種萊蓬

請用



日本三共株式會社出品

リオゲン



元農利

包裝 500g 入

包裝 100g 入

製造元：三共株式會社

進口：招德貿易股份有限公司

【答】：羊乳消毒，不用加什麼藥品或香料，製奶粉是不可能的事，因為你沒有這種設備，在外國來講，目前還沒有羊奶粉，因羊乳的本身產量不多，還是吃鮮乳的好。至于羊乳的味道不佳，這是一種習慣，吃慣了自然不覺得有何不好的味道，但是你的羊舍要清潔，母羊身體也要經常保持清潔，最好不要和公羊放在一起，尤其是擠乳期。羊乳消毒最簡單的方法，是用紗布過濾，然後用小鍋煮，或是蒸均可，不可蒸煮太久。（黃立羣）

銀猪次數數量

根據猪隻大小決定

【問】：（一）猪隻各期每隻應喂食多少乾飼料，如何控制才不致過食以符經濟。每天分幾次喂飼才理想。

（二）甘藷或甘藷蔓等青料，生食與熟食何種為優？營養與衛生兩者兼顧而言，有什麼方法（甘藷是施猪肥）。

（三）青飼料應在何時喂食，喂食乾料前後或中間，每天青飼料多少？

（四）中大小猪每日飲水多少？
（五）水質鐵份過多，如何補救？
（六）中午不喂，改夜晚十一點飼食是可行。
（臺北汐止鎮茄冬里七二號唐榮福）

【答】：（一）猪隻飼餵次數，以猪之大小而應有分別，小猪讓其任吃或分五、六次，中猪四、五次，大猪三次，每次之量在三十至一小時內吃完為止，才不致過食，大約小猪一、一·五公斤，中猪一·五、二公斤，大猪二至三公斤。

（二）依消化與衛生上來說，熟食較好，但消耗燃料及勞力，青料不宜過煮，因會損失維生素。若要避免病蟲感染，青料不要施猪糞尿。

（三）青飼料給與時間，以間食為宜，每天約半公斤就夠。

（四）飲水量不要限制任其飲食。
（五）水質鐵份過多，應設噴水或滴水設備使水中鐵份氧化後過濾。

（六）如能如此做，對猪隻之採食消化增重等更有利。（張聯欣）

農友大福音


◎適合春夏栽培蔬菜品種，由二代七十餘年之種子專家親自改良特選品種，信用最可靠供應國內外農友可安心栽培，希勿失良機，敬請賜顧選購。

1. 早春35天結球白菜 (下種期：農曆元月下旬至二月下旬)
 2. 鳳山短種50天蘿蔔(菜頭) (下種期：農曆元月上旬至十月下旬)
 3. 頭州早長種50天蘿蔔 (下種期：農曆二月上旬至十月下旬)
 4. 青粉葉30天結球白菜 (下種期：農曆三月上旬至七月下旬)
 5. 新夏秋35天結球白菜 (下種期：農曆三月上旬至八月下旬)
 6. 坂田一代交配中早生甘藍 (四季均可下種)
- 其他各色品種應有盡有及各種農藥、肥料等詳細請參閱一九六四、五年新園藝。

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號

藥勁特種水



大京元化學工業股份有限公司

公司：臺中市西區三民路一段97號
工廠：臺中縣大里鄉塗城村92號