

！藥用心小，菇洋護保

悟信

洋菇是近年來新興的加工外銷作物，對於病蟲害的防治，特別慎重，經本年度植物保護技術審議委員會修訂的暫行使用推廣方法，無論在用藥種類和用藥方法上，都有顯著的改進。

(一) 栽培前

(1) 菇舍處理：(1)可密閉菇舍門窗加設尼龍細紗網，以防菇蠅飛入菇舍內為害。

(2) 堆肥上床前，一至二週，菇舍內經大掃除後，用「DDT、福爾馬林」混合藥液（十公升水中加入一百公克七十五% DDT可濕性粉劑，和一百至二百公撮工業用「福爾馬林」，每坪DDT約二公克，「福爾馬林」二至四公撮，即每坪稀釋液二百公撮），噴射菇舍牆壁、屋頂、地面和棚架等處，噴射後將菇舍密閉一天。

(3) 於菇舍消毒後，如有跳蟲，立即在菇架、菇舍內角落和地面等處，每坪噴射五十% DDP乳劑二千倍稀釋液一公升。最低菇床應離地面二十公分。

(4) 堆肥處理：堆肥醱酵熱度需達攝氏七十度左右，以便殺死潛伏的病菌害蟲。


(5) 覆土處理：覆土用表土下一尺的土壤，並用「福爾馬林」五十倍稀釋液消毒，再蓋上玻璃布，二十四小時後撤去玻璃布，將土壤散開七天左右，使「福爾馬林」氣味消失後才可使用。

(二) 栽培中

(1) 堆肥上床後每隔一個月，將菇舍門窗尼龍細網噴一次六十%「大利農」乳劑五十倍稀釋液。

(2) 洋菇上發現有蠅幼蟲時，在菌床上每隔二至六天噴射一次四至四十%「除蟲菊精」乳劑二千倍稀釋液或六至六十%除蟲菊精乳劑三千倍稀釋液，連續噴射三至五次，至蠅幼蟲消滅為止。每坪施用稀釋液二至二·五公升（噴藥可和澆水合併舉行）。

(3) 經常噴射千分之〇·一五氯水（即二公升加入三十%有效漂白粉一公克）。發生褐斑病時，先將病區洋菇全部採收後施用「大生二二」五百倍稀釋液，每坪用量一至一·五公升藥液，均勻噴射在覆土表面，每隔五至七天噴射一次，連續噴射二次。



病斑黑和 (右) 病斑褐菇洋

發財大機會

2,000,000元

獎 大 贈



- △住必樂殺蟲藥劑
- △賽文水和劑
- △甲基巴拉松乳劑


愛國獎券

八月十五日對照
獎券多買多送
農藥每滿七十五元即送

凡購「豐年牌」

興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新路59號
電話：五〇八七、五〇八八、五〇八九



農業要覽「糧食作物」輯

豐年讀者服務部代售

農林廳編印・農復會補助

格 價

角二元五十四・冊大二套全

(內在費郵號掛括包)

買 購

請到
附近郵局
，利用郵
政劃撥五
九三〇號
豐年社帳
戶匯錢即
可。

跳蟲防治：①利用燈光誘殺。②跳蟲較多的菌架地面和牆角等處，每坪噴射五十%DDVP乳劑三千倍稀釋液一公升。(DDVP菌床上勿用)。
(四)鼠害嚴重時，於菌舍四週角落等處，放置殺鼠餅數塊，殺鼠餅經老鼠吃完後，應行加添。
(五)蟻蟻防治：在菌舍內四角有蟻蟻，噴射四十%阿特靈可濕性粉劑五十倍稀釋液，但切勿噴射牆角以外的地方。
施藥時應注意事項：
菌床覆土含量不可過高，以免洋菇菌絲生長發育受阻。
(三)栽培後

洋菇收穫完畢後，儘快搬走堆肥，並即打掃菌舍保持清潔。



蝶(上左) 蚱(上右) 蟻(下左) 蟻(下右)



稻熱病的特效藥

預防兼防治，
收穫保證滿意。

依照53年度植物保護推廣方法，防治葉稻熱病，穗稻熱病，各施用一次，提高產量，本輕利多。

農林廳登記農藥字 158 號

日農

シンカル錠剤

日農新米裕片劑 (推廣手冊譯名，新美爾片劑)

農林廳登記農藥字 157 號

日農

シンカル乳剤

日農新米裕乳劑

- ◎可與其他殺蟲劑混合施用，節省勞力。
- ◎片劑即將在全省各鄉鎮農會供應農友。

進口現貨供應 泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路2段108號 電話：44994

製造廠 日本農藥株式會社

東京・大阪