

！藥用心小，菇洋護保

悟信

洋菇是近年來新興的加工外銷作物，對於病蟲害的防治，特別慎重，經本年度植物保護技術審議委員會修訂的暫行使用推廣方法，無論在用藥種類和用藥方法上，都有顯著的改進。

(一) 栽培前

(1) 菇舍處理：(1)可密閉菇舍門窗加設尼龍細紗網，以防菇蠅飛入菇舍內為害。

(2) 堆肥上床前，一至二週，菇舍內經大掃除後，用「DDT、福爾馬林」混合藥液（十公升水中加入一百公克七十五% DDT可濕性粉劑，和一百至二百公撮工業用「福爾馬林」，每坪DDT約二公克，「福爾馬林」二至四公撮，即每坪稀釋液二百公撮），噴射菇舍牆壁、屋頂、地面和棚架等處，噴射後將菇舍密閉一天。

(3) 於菇舍消毒後，如有跳蟲，立即在菇架、菇舍內角落和地面等處，每坪噴射五十% DDP乳劑二千倍稀釋液一公升。最低菇床應離地面二十公分。

(4) 堆肥處理：堆肥醱酵熱度需達攝氏七十度左右，以便殺死潛伏的病菌害蟲。


(5) 覆土處理：覆土用表土下一尺的土壤，並用「福爾馬林」五十倍稀釋液消毒，再蓋上玻璃布，二十四小時後撤去玻璃布，將土壤散開七天左右，使「福爾馬林」氣味消失後才可使用。

(二) 栽培中

(1) 堆肥上床後每隔一個月，將菇舍門窗尼龍細網噴一次六十%「大利農」乳劑五十倍稀釋液。

(2) 洋菇上發現有蠅幼蟲時，在菌床上每隔二至六天噴射一次四至四十%「除蟲菊精」乳劑二千倍稀釋液或六至六十%除蟲菊精乳劑三千倍稀釋液，連續噴射三至五次，至蠅幼蟲消滅為止。每坪施用稀釋液二至二·五公升（噴藥可和澆水合併舉行）。

(3) 經常噴射千分之〇·一五氯水（即二公升加入三十%有效漂白粉一公克）。發生褐斑病時，先將病區洋菇全部採收後施用「大生二二」五百倍稀釋液，每坪用量一至一·五公升藥液，均勻噴射在覆土表面，每隔五至七天噴射一次，連續噴射二次。



病斑黑和 (右) 病斑褐菇洋

發財大機會

2,000,000元

獎 大 贈



- △住必樂殺蟲藥劑
- △賽文水和劑
- △甲基巴拉松乳劑

愛國獎券

八月十五日對照
獎券多買多送
農藥每滿七十五元即送

凡購「豐年牌」

興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新路59號
電話：五〇八七、五〇八八、五〇八九