


農友經驗



玉米芋頭間作

如果打算玉米和芋頭間作，在玉米播種之前的整地時，在兩行玉米的左右預留一條直溝，等玉米的施肥工作完成後馬上培土，便是用左右直溝裏的土，培到玉米植株的基部。土要培深些，然後用地特靈消毒，再準備約一尺長的木棍，當作量距離，挖好植穴把芋頭種下去。如太乾燥則先灌水後施肥，然後再培土，把原來培在玉米莖旁的土，用鋤頭培回芋頭的畦上，使芋頭能長大。這裏要注意的，是玉米和芋頭間作的行株距離要放寬，才不會影響芋頭的生長。同時我所種的芋頭品種叫做「麵芋」，因為這品種的芋頭，在煮食時容易爛熟。（臺南縣善化鎮胡厝里二百三十九號胡國在）



友農在國胡

試種節瓜三月收完

我以前獲得貴刊贈送的節瓜種子，栽培結果非常理想。節瓜是節節開花的，每個瓜可達五、六公斤，十一月至十二月播種後，翌年三月即可收完。播種前要用谷仁樂生兩千倍液消毒種子，經半小時後撈起曬乾，才可播種，到長出五葉後移植，每株間隔

約七英尺，寬約一臺丈。管理分為縛株和伏地兩種。在中耕時施磷肥，結瓜時施硫酸銨，水肥則視需要隨時施用，所以化學肥料也用不多。如果自己留種的話，普通在開花後升天，節瓜不再發育開始，再經廿天便可採收，每果約有種子一千粒。（臺北縣林口鄉下福村四十號廖金西）

間拔玉米雄穗可增產

玉米的雄花生在莖端，雌花生長在莖節上，雄花的形成期比雌花早。因為玉米抽穗時要消耗大量的養分，同時也是決定穗數和大小的時候。那時除了要多施肥外，還有一個辦法，就是去雄。但要注意祇能去掉若干雄穗，並不宜把整行的雄穗都去掉，通常每五行留一行，並在迎風方向也要留一兩行，如留得太少，會發生受粉不完全即缺粒過多的現象。去掉了適當的雄穗便可使雌穗有充分發育的機會。去雄的時間要適當，即在雄花剛長出約三分之一時，先把包葉輕輕剝開，不要傷害葉片；右手抽雄花，左手握着株桿輕輕往上一提，雄穗便很容易抽出來了，同時左手勿握過高，否則會把雄穗折斷，但也不能過低，以免連葉片抽起。

我的經驗，抽去部份雄穗的產量，可比普通的增收兩成多。（彰化縣埔打村打



友農賢欽陳

ORTHO

歡迎採購
現貨供應

瘡痂病特效藥

福爾丹

50% 可濕性粉劑
ORTHO PHALTAN
50% W.P.



改換包裝敬告客戶啓事
敝公司為確保福爾丹品質及使田間作業使用方便起見，特自三月十五日起將原 P.V.C. 一磅包裝改換以紅、黃、藍三色精美彩盒盛裝（內為 P.V.C. 半磅裝二包合計一磅），敬請客戶繼續惠顧。

經銷處：泰洋股份有限公司 臺北市重慶北路二段108號 電話：44994
東益貿易公司 臺北市天水路2號之4 電話：43802
正豐化學股份有限公司 臺中縣霧峰鄉草湖路2號 電話：霧峰63
總代理：惠農股份有限公司 臺北市長安東路二段16號 電話：52093
製造廠：California Chemical Company ORTHO Division